

CLAVDII
GALENI
PERGAMENI DE
DIFFERENTIIS
FEBRIVM LIB

BRI DVO,
Laurentio Laurentiano Florenti-
no interprete,

Accuratè per Simonem Thomam recogniti,
& ex fide Græci exemplaris penè
alij facti.

REM MAXIMAM SIBI




PROMITTIT PRUDENTIA.

LVGDVNI,
APVD GVLIEL. ROVILLIVM,
SVB SCVTO VENETO.

M. D. XLVIII.



de arulo



10-502

7

U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

1911

LAND OFFICE

WASHINGTON, D. C.

RECEIVED

1911

1911

U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR



U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR

1911

1911

1911


1911

METHODVS LI-
BRORVM DVORVM
DE DIFFERENTIIS

FEBRIVM.



ALENVS statim initio designat unde febrium differentie traducantur. Quae omnino à substantia rei quae definitione febris explicatur uel accidentibus, & maxime ijs quae propria sunt & quasi familiaria febri: πρῶτον inde uocant Philosophi, quia rem ipsam necessario consequantur, aut certe ut plurimum ei accidunt: differentias repetit, deinde alijs quae communia quaeque ambigua in hoc & aliud febrium genus incidunt. Quae posteaquàm breuiter statuit, uexat medicos qui sine arte & methodis logicis diuidant atque ita rudes commentarios tradant sine arte, & aconomia, & ordine. Quae ut plenius intelligantur recurrendum ad praecepta logica in quibus facultas diuidendi constituta, recognoscendum ex Philosophis quid πλειονασμός, ἔκκλισις, ἀφαίρεσις, ἀφ᾽ ἑκλινῆς, πρῶτον, ὑπὲρ βίου, quae denique uitia & uirtutes diuisionis. Iam uerò ex Hippocrate plenam febrium diuisionem transcribit. Ex quo in compendium & certas differentias



contrahit. Atque hic ad aliud methodi genus se
 conuertit *Ἀναπείσις* Plato, Hippocrates *διο-*
ερισμός & *διαστολή* appellauit. Ars est quæ iam
 distinctas species inter se comparat quid in ijs cō-
 mune & proprium quid idem & diuersum, quid
 denique simile ac dissimile dijudicat. Atque ita
 partim communibus, partim proprijs singulariū
 essentiam constituit, & definitione explicat. Rur-
 sus constitutas species subalternans καὶ ὑπο-
διαίρει appellatam secat, atque iterū ad *διο-*
ερισμόν premit, eaque persequitur dum ad postre-
 ma uentum sit, differentiis quasdam acciden-
 tarius seorsum annotat & eorum causas
 quæ in febrium naturam incidunt, sta-
 ta periodi fluxionum & similitum.

Simplices quoque febres pri-
 mum, deinde comple-
 xas artificiosè de-
 clarat.

CL. GAL. PERGA-
MENI DE DIFFE-
RENTIIS FEBRIVM,
LIBER PRIMVS,

INTERPRETE LAVREN-
TIO LAVRENTIANO
FLORENTINO.

*Quenam sint febrium differentia principa-
les, & quòd essentia febrium sit in genere caloris
præternaturam.* CAP. I.



DIFFERENTIAE febrium, *Febrium dif-*
maximè quidem propriæ ac *ferètia dis-*
principales, secūdum earum *plex.*
substantiam sunt: aliæ verò *Accidens*
secundum aliquod accidēs. *duplex.*

Quoniam verò & ipsorū accidentium non
vna est natura, sed aliā quidē propinquiora,
magisq; propria diuidendæ substantiæ sunt,
alia verò remotiora ac magis aliena: idcir-
co & earum quæ hinc sumuntur differētia-
rum minimè vnum genus est. Itaque maxi-
mè quidem peccant, quicunque differentias
propriās ac maximè principales omittunt.
Deinde verò, quicunque mētione harū fa-
cta permiscet cum eis differentias acciden-
tales æqualiter omnes, minimè discernētes

Παιονασμὸς in explicandis differentiis intelligitur non solū
 quia extra naturam rei, quæ diuidiur excurrit diuisor, sed
 quia plu-
 res enume vtiles ab inutilibus. Non solām autem pec-
 rat quam carunt plerique medicorum in ipsis differē
 institutū tiarum generibus, aut plures quām oportet
 in præsē- ret tradēdo, vt inutiliū quoq; meminert:
 tia requi- aut pauciores, vt nōnullas etiā vtilēs omi-
 rat, hic e- rint: sed etiā diuidēdo genera ipsa in pro-
 nim ita- prias differētiās, similiter errarunt. Ne lon-
 tractatur- gius abeas, quū primū ac maximē pro-
 ars ut ali- prium differentiarum genus, ab ipsa diuidē
 quid pru- dæ rei substantiā sumatur, videas tamē nō-
 dentia & nullos medicos prætermisisse vnīuersum
 consilio re hoc genus, alios verō diuidēdo plura quām
 linquatur. opus esset statuīsse, aut in primis substituisse,
 Explica- tametsi Hippocrates optimē fecerit diuisio-
 tio distio- nē lib. 6. Epidemion. Dīctio autē habet in
 nis repetē- hunc modū: Febres, hæ quidem manu sunt
 da ex com- mordaces, illæ verō mites: quædam autem
 ment. Ga- non mordaces, sed incrementes; nonnullæ
 len. in 6. acutæ, sed ab ipsa manu deuictæ: quædā sta-
 epid. 1. ubi tim ardētes, quædam verō semper debiles,
 multīs tum siccæ: aliæ salis, aliæ inflatæ, aspectu gra-
 ues,
 alia explicātur, tum hoc uerbum τῶν πυρῶν, at in exe-
 gesi uocum Hippocratis breuius ἢ τοῖς νοσήσιν. ὅμοιοι καὶ ὑπερ-
 τῶν ὁμοίων καὶ ὑπερῶν, in quibus scilicet magna uis humi-
 ditatis & flatuum est.

ues, aliæ ad manum humidæ, aliæ rubicundæ valde, aliæ liuidæ, aliæ præpallidæ, & alia istiusmodi. Apertissimè enim hoc loco ab ipsa rei substantia, simulq; ab ipsa dignotione in proprias differentias fecit diuisionem. Nam essentia quidem febriū est in genere caloris præter naturam. Differentiæ verò caloris, & ex eo quòd maioris minorisque rationem admittat, sumuntur, & ab ipsa materia, in qua calor ille præter naturam existit, & ab ipso mouendi modo: quas omnes complicans, cum dignoscendarum earum ratione scripsit, quemadmodum procedente sermone docebimus. Porro autem quæ à maioris minorisque ratione ducuntur, sunt manifestæ: & in hoc genere differentiarum, medicis mos est magnam, ac paruam febrē nominare, verum impropriè quidem de rei qualitate quantitatis vocabulum enuntiant, sed ita facere cōsueuerunt, non in febre solum, sed in aliis sexcētis; quæ in qualitate quidē ipsa essentiam habent, ceterum magna paruaq; nominantur. Quæ verò differentiarum à materia sumuntur, in qua calor ille præter naturam consistit, maximè propriæ caloris præter naturam differentiarum sunt: siue corpus ipsum cor dis præhenderit, siue humores conditos in ipsius ventriculis. Reliqua autē ac tertia differentia est, vbi aërea substantia sola admo-

Differentia à materia ducta maximè propria.

Analogia.

dum incaluit, humida verò ac solida corpora adhuc quidem incalescunt, sed nondum incaluerunt. Nō enim parū differt, incalescere aliquid dicas, an incaluisse. Sed discas eidentissimè, id quod dicitur, ex his exemplis. Finge aquam calidam inditam lebeti frigido, deinde ab ea ipsa aqua cale fieri contactu ipsius lebetis corpus, nondū autem totū exquisitè incaluisse, & rursus finge in calidum, atque ignitum lebetē frigidā aquam inditam, deinde cale fieri quidē adhuc, nondum autem incaluisse. Ex his exemplis, cū secundo quidem prima febrium differentia similitudinem habet, quas corpus ipsum cordis præhendisse docuimus: cum primo autē, secunda, quas conditos in ventriculis humores occupasse diximus. Reliqua autem ac tertia differentia exemplum omnino simile non habet: sed claritatis causa, finge fabrilē follem trahere ad se aërem admodū calidum: deinde cale fieri adhuc ab eo, nondum autē incaluisse. Sed exemplū magis indicabit rei declarandæ naturam, si finxeris, in folle contineri humorem: atque adhuc magis, si foramina folliis per quæ trahit atque emittit aërem, ita angusta effeceris, ut humori quidē inuia, aëri verò peruia sint: Qua sanè in re potissimum dissident naturæ opera, ab his quæ homines ipsi efficiūt. Etenim sub-

stā

stantia aërea permixta cum sanguine est in omnibus arteriis, per multa foramina pariter spirantibus: ac nihilominus in ipso corde, ut quæ per eas omnes confluat.

Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum in humoribus, interdum in partibus animalis solidis, quas Hippocrates continentia nominavit.

C A P. II.

Hic ergo calor præter naturam, quem appellamus febrem: alias ex alio de prædictis incipit. Occupat autem, ac simul afficit cum eo quod affectum est, reliqua duo genera Facillimè ergo calor ex humoribus ad spiritum trāsmeat: humores autem tardius ignem concipiunt à succenso spiritu: atque etiam solidum corpus promptius tribuit calorem humoribus, aëriæq; substantiæ, quàm ipsum ab illis accipiat, omnis enim substantia tenuis facilius quàm crassa alteratur. Tenuissimus autem aër, crassissima autem corpora solida sunt: humores medio genere ambigūt. Nec quicquàm refert præsentis loco, spiritum vel aërem appellare, nā de his alibi fusius diffinitū iam est. Nunc verò sufficiet illud tantūmodo scire, quod (puto) Hippocrates indicās dixit, Cōtinētia, ac cōtenta, & impetū facientia. Continētia quidē appellans, ipsas corporis partes solidas: con-

Febrim
ordo.

† πικρὸν
τοῦ depa-

scitur &

quasi ser-

pit transi-

litq; è spi-

ritibus ad

humores

& contrā

atque hinc

etiam soli-

dum cor-

pus perua-

dit.

Facile per-

mutabi-

lia.

Continen-

tia, conten-

ta, & im-

petum fa-

cientia.

*Febrium genera se-
consequo
trahunt.*

tenta autem, humores: impetum verò faciē-
tia, spiritus. Febrilis enim dispositio aliàs ex
alio de prædictis incipit: verum in eo gene-
re quod primum affectum est minimè per-
manet, sed occupat reliqua duo: ac nisi prius
soluatur, processu tēporis illa similiter affi-
cit, atq; hæc summa sermonis est. Sed oportet
ea quæ dicta sunt, demonstrare, notas-
que vniuscuiusque generis febrium percur-
rere. Statim itaque de generatione earum
dicere aliquid opus est.

Quoniam modo febris ephemera, id est, diaria
ex causis primitiuis atque euidentibus præben-
dat, qualis empiricorum qualis rationalium uia
sit ad inuentionem, quæ quoniam partim expe-
riētia, partim ratione perficiatur, sine methodis
logicis esse non potest. Ex suppositione paulatim
ad genus febrium descendit, & hoc ex materia
diuidit.

CAP. III.

*Febriū ge-
neratio &
cause præ-
gressæ.*

EX lassitudine ergo, ira, mœrorē, vltio
ne, frigore, insomnio, cruditate, temu-
lentia, ac satietate, quosdam febricitare cun-
ctis hominibus perspicuum est, ab ipsa rei
euidētia edoctis. Quinetiam pestilentem
aëris conditionem afferre febrem, mini-
mè ignorant, quicumque intellectu par-
ticipant: quemadmodum & versari cum
his qui peste laborant, periculosum esse.

Aff

Affici enim periculū est, quasi à scabie quādā, aut ophthalmia. Periculosum prætereà *Contagiosi morbi.* est, consuescere his qui tabe tenentur, atque in totum cum omnibus qui putridum adeò expirant, vt domicilia in quibus decumbūt, grauiter oleant. Constat prætereà ex lōgo *Putridum rerum usu,* vt qui consuetudinem exercitationis omiserint, vt aliis multis morbis, ita *expirantes.* nihilominus febrilibus corripiantur. Et itē, vt quæ vocatur plethora generet febres, atque etiā prauī tibi, ac medicamēta, & æstus circa Canis syderis ortū: & alia huiusmodi cūctis hominibus (vt ita dixerim) perspicuū est. Quæ verò ab ipsis in corporibus nostris fiat affectio ex qua febricitamus, minimè sciunt, neque plerique hominum, neq; quidam medicorum. Duplex autē genus ignorantium talis est: alterū quidem, quod ipsā experientia tantūmodò nititur, tãquàm nulla rei cuiusquàm natura, ratione possit inuestigari. Alterum autē genus est eorū qui sapientes quidē videntur, sed cūm ignorent æquē quàm priores, scientiæ tamen habent existimationē. Ignorare autem eos contingit, quia nullam habent in methodis logicis *Ignorantiæ causa.* exercitationem, ex quibus cognoscuntur ac discernuntur à demonstratiuis sumptionibus *Logicarū methodorum usus.* verisimilia quidē, sed quæ nihil veri aut inuenire aut demonstrare possunt. Huic autem insci

inscitiae insolentia accessit, ob quam nonnulli ex eis in tantam audaciam atque amentiam deuenerunt, ut nec ea quae omnes homines cognoscunt, experientiam ipsa edocti febrium causas esse concedant. De quibus cum libro de causis procatareoticis abunde docuerim, nihil opus est hoc loco mentionem facere temerariae loquacitatis eorum. Neque enim contradicere, neque soluere sophismata hoc libro institui: sed instituere ac docere, subiiciendo

Postulatū. ea quae alibi à nobis sunt demonstrata, ac docendo differentias febrium. Subiiciunt ergo, caliditatem, frigiditatem, siccitatem, atque humiditatem esse elementa corporum, ac fieri pri-

Febris in- mas aegritudines ex intemperie horum, è quibus
temperies vna febris existit, quoties calor quidam praeter naturam in corde extiterit. Differentiae autem secundum genus caloris, de quibus praesens sermo tractat, ab ipsa materierum genere triplicium differentia ducuntur, suscipiuntque tigneam caliditatem. Aut enim in ipso corpore cordis,

† *Præ-* aut in humoribus prima ipsa acceditur, ut dicebamus, aut in spiritu. Praeueniunt autem
τῷ δὲ πνεύματι.
febrilem. omnium febrium constitutionem nonnullae causae omnibus manifestae, de quibus paulò antè

Empirici docuimus, ex quarum observatione empiricus quidem medicus ad curationem nonnullis differē-
et rationalis hil iuuatur. Rationalis uero ad ipsam rei naturam accedens, per indicationes ab illa in fu-

tur

tutorum præfensionem, atque inuentionem curationis, iuuatur: vtēs omnibus quidē experientiā ipsa inuentis, adiiciens autem ipsis multa ex docendi via rationali. Quæ ergo sint per vtrianq; partem inuenta (experimentum intelligo ac rationē) alio loco docuimus. Quæ verò dispositio ab vnaquaq; causa procatur & ica in corpore consistat accendens febrem, nunc docere instituimus.

*Rationalis utitur
& ratione
& experi-
mento.*

Multas esse causas caloris præter naturam, ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia corpora promptè se habeant ad continendum diutius caliditatem.

CAP. IIII.

Cum ergo videamus nō vnum modum, neque generationis, neque auctoris caliditatis (quando ne ipsius quidem ignis modus vnus est) sed gignitur aut propter motum, aut propter putrefactionē, aut quia alteri caliditati consuescit, aut propter suppressionem calidi effluuii, aut propter permutationem calidæ substantiæ, tanquā de fonte quodam ebullientis aut genitæ, scilicet ad nostrum sensum, aut augmentis caliditatem: necesse est omnes febrium causas in prædictos modos reuocari: qualis si lubet æstus est, siue ex ipso sole actio talem habeat appellationem, siue affectio quæ in corpore efficitur, siue ea quæ iā effecta est. Nā

*Caloris
multiplex
genera-
tio.*

*Febrium
cause uni-
uersales.
Æstus.*

Febris se- & ea ipsa calor est præter naturam: nondum
des. st. cor. tamen febris, nisi cor ipsum concalefecerit.
Calor ex Sanè totū hoc genus causæ ex cōsuetudine
calidi oc- efficitur rei calefacientis, siue sol, siue ignis,
cursu. siue medicamētum fuerit id quod calefacit,
Color ex extrinsecus quum aut attingit, aut propiū
motu & accedit, aut consuescit, vel quouis, alio mo-
ebullitiōe. do libeat appellare. At verò ira quasi ebulli-
Ira calor tio quædam ac motus vehemens est irascibi-
quando fit lis facultatis, quæ in ipso corpore cordis se-
febris. dem habet. Cōcalescit autem interdum cū
 ea spiritus, atq; interdū sanguis, & si prom-
 ptè se habeant suscipientia corpora ad con-
 tinēdum diutius caliditatem: quāuis ipsius
 cordis motus destiterit, hæc permanent ca-
 lida præter naturam, tuncque febricitare ho-
 minem necesse est. Hæc ergo febris princi-
 pium habet, motum atque ebullitionem na-
 tiuæ caliditatis. Febris autē quæ ex mæro-
 re consistit, non etiam ebullitionē, sed mo-
 tum tantummodo principium habet. Si au-
 tem ex lassitudine efficiatur, principiiū qui-
 dem habet motum ampliorē musculorum,
 ac neruorum, & ligamentorum, & articulo-
 rum, quæ quidem prima calefiunt: calor au-
 tem continenter cordi distribuitur, ac tunc
 febricitant. Vbi verò febris propter densita-
 tem cutis acceditur, qualis maximè astrictis
 refrigeratisq; fieri solet: collecto in corpo-

re mordaci effluuio cōsistit. Diffilatur enim *Difflatio-*
semper animalium corpora duobus modis, *nis forma*
emissis foras quotidie vaporosis, fumosisq; *duplex.*
excremētis: attracta autem intrò aërea sub-
stantia refrigerante, atque ventilante natu-
ralem caliditatē. Vbi igitur fortis causa cō- *Effluuium*
densando cutē prædictos meatus astringat, *uaporo-*
sæpe plethorā inducit, quoties vaporosa ac *sum &*
benigna materia affluit: interdū febrem cō- *mordax.*
mittit, quoties acris, ac mordax fuerit. Idq; *Auctionis*
maximè quum ex eo augetur calor, quia re *caloris cau*
frigerans aër intra corpus non trahitur. Ex- *sa potissi-*
cernitur autē excrementū acre, ac mordax, *ma.*
aut iis qui sunt naturā malis humoribus ple- *Effluuium*
ni, aut iis qui malos cibos ingesserūt, aut sæ *mordax*
pè nō benè cōcoxerunt, præsertimq; iis qui *quibus ex-*
præterquā quodd cibis dictis vescūtur, etiam *cernitur.*
limiosam, aut lutosam, aut cœnosam, aut pa-
lustrem, aut stagnātem, aut alio quouis mo-
do corruptam & putrefactā aquam bibunt.
Eodē modo euenit, vbi immoderatè labo-
rēt, aut virgilēt, aut t̄ angore afficiantur, aut t̄ *φασγί-*
acria medicamēta frequēter ingesserint. Ci *ῥασί.*
bos aut malos intelligo, & qui ex natura ta *Cibi mali*
les sunt, vt allia, cæpe, nasturtiū, porriū, bras- *forma du*
sica, ocymū, vrtica: & alii quicūq; nominā *plex.*
tur agrestes, vt laplanæ apud nos: atque etiā
qui boni sunt ex natura, sed ob putredinem
quādam prædictis æquale, aut maius sæpe-

numerò vitium acceperunt, vt ordēū, ac tri-
 Cibus bo- ticū, & aliæ omnes fruges: partim ob tēpo-
 nus tripli- ris longitudinē ad putridam dispositionem
 ci forma deductæ: partim situ quodam repletæ, quia
 uitiatur. prauè repositæ sunt: partim ex prima gene-
 Vitiosi ci- ratione ab ipsa rubigine vitiatæ. Tales igi-
 bi incom- tur cibos etiā nūc pleriq; comedere coacti
 moda. præ fame, vel febribus putridis, ac pestilēti-
 τῆς αὐτῆς - bus mortui sunt, vel † pustulis scabiosis aut
 μωσι. leprosis correpti. Vbi igitur corpus fuerit
 Astringio- plenū talibus humoribus, nulla autē obstru-
 nē & ob- ctio in visceribus fuerit, atq; animal in cute
 structionē tota liberè diffletur, ac refrigeretur, sanum
 alia se- quidē existit: sed breuē, lubricamq; obtinet
 bres sequi- sanitatem. Vbi verò exterior terminus aut
 tur. astringatur, aut in profundo meatus obstrua-
 Ex crudi- tur, si adstringatur, nunc dictū febrium ge-
 tate febrī- nus, si oppiletur, id quod paulò pōst dicendū
 citantes. est, cōsistit. Nihil igitur mirū videri debet,
 Febricitā- si ex cruditate, hi quidē febricitēt: illi nihil
 re parati. eiusmodi patiātur. Etenim iis qui malis iam
 † ὁ δὲ λατὰ humoribus pleni sunt, ac malè diffiātur, aut
 αἱ τὰ κατὰ intēpestiuè laborāt, aut lauātur temerè, prō-
 τῆς γαστρί- ptum est febricitare. Iis autē qui bonis sunt
 πρὸς τὴν βε- pleni humoribus, ac probè diffiātur, & quie-
 ne habēt à scūt, ac † fouēt ad iecur, & ventriculū attinē-
 iecinore, tes partes, impossibile est febricitare (in iec-
 & uētricu core enim ac ventre manet quicquid corru-
 ptū est, ac tēporis spatium paulatim cōcoqui-
 tur

tur atque efficitur benignum.) Quemadmo-
 dum & iis qui motus fortiores sustinuerint,
 aut in sole æstiuo steterint, aut in balneum
 calidum dulcium aquarū descenderint, tibi
 corrupti in vniuersum corporis habitū trās-
 sumuntur: sic eos quibus corrupta cibaria
 deorsum deferuntur, febris minimè sequitur
 nisi propter aliquā aliā causam: vt si sæpenu-
 mero surgēdo in lassitudinē inciderint, aut
 ventrem ipsum inflammatio tentauerit.

Ex putredine accendi febrem, cuius causa est
 obstructio: ac potissimum putrescere, quæcunque
 calida atque humida sunt.

CAPUT V.

CAeterū si meatus obstruantur atque
 humores stipentur (nam de eare doce
 re distuli) animalia putridis febribus tentan-
 tur. Promptissimè enim putrescūt, quæcun-
 que calida & humida, & multa sunt in locis
 calidis, nisi diffilentur, ac refrigerētur. Ergo
 neque mirū videri debet, quamobrē febres
 sequantur plethoram: quoniā per eiusmodi
 dispositiones multæ obstructions efficiun-
 tur, ac totū corpus difficulter diffilatur. Igi-
 tur ex plenitudine quæ est ad ipsas vires,
 humores ipsi citò corrumpuntur, neque eu-
 cti, neque concocti, probè: quippe quodd vi-
 res conficientes eos, debiliores existant.

Quocirca quæcunq; cibaria glutinosa crassaq; sunt, morbos cōmittere magis possunt, obstruere enim, atq; stipare humorē ex illis facilius est. Sed nonne cōtrarias scilicet ex-
tenuātia & acria, morbos committere possunt? Videtur enim qui alterutro victus genere frequētius vtūtur, febre similiter præhendi: quia hæc omnia (vt antè diximus) malos humores gignere assolent. Hæc ergo, ratione ea quod malos humores gignunt, februm causa sunt: alia verò ratione putredinis, quæcunq; glutinosa, crassaq; existunt.

Ex inflam-
matiōe fe-
bris.

† ρεῦμα.

† εἰς οὐτε-

λατῶδες.

† φλεγμο-

νώδες.

† ἰππώ-

μιαν qua-

si aduenti.

tui nomen

ex acci-

dei super

datum ue-

lut cogno-

men.

Nec fecus partes inflammatione affectæ ratione putredinis accendunt febrē. Impactus enim in eas, qui influxit humor, vbi fuerit naturâ calidus, quia nō benè diffatur, putre-
scit. Vbi igitur † decurrēs humor fuerit plannè biliosus, caliditas † sacro igni sub similis occupat partē, vbi sanguineus † inflāmatioi sub similis ex ambobus verò mistus, vel erysipelas fit phlegmonodes, vel phlegmōe erysipelatodes: nomē quidē sumens ab humore domināte, † denominationē verò accipiens ab altero. At verò ex his omnibus acceditur febris, ratiōe societatis. Semper enim simul cum eo quod incaluit, pars continua calefit, quousque affectio ad cor ipsum peruenerit. Nam & continuè carbunculis partes cum eis simul calefiūt, genitis ex sanguine perquā
cali

calido, sed magis melācholico propter aduſtionem.

Pestilentis febris causam eſſe inspirationem potissimum quoties corpus in eam dispositionem sit preparatum, quoniam maxima pars generationis morborum est corporis preparatio.

CAPVT

VI.

CAlidiores prætereà ambiētis nos aëris conditiones (quales sunt circa Canis syderis ortum) potissimum per inspirationem perspicuè cor ipsum calefaciunt: extrinsecus verò circumfusæ corpori, totum ipsum calidum reddunt, maximeque arterias: vt quæ nonnihil substantiæ ipsius ambientis aëris attrahant, ex quibus omnibus simul afficiatur cor necesse est, atque ipsum in primis immodicè caleſiat, maximeque febrili dispositione tentetur, atque toti subinde corpori immittat oportet. Vbi verò pestilentes subeant conditiones, inspiratio potissimum causa est. Interdū enim efficitur febris propter humores in corpore aptos in putredinem, quoties animal breuem quādam occasionem ab aëre circūfluente suscepit; sed magna ex parte incipit ex aëris circumfluentis respiratione, quæ putrida exhalatio *Putredinis aëris* infecit. Principiū autē putredinis, aut multo mortuorum est minimè crematorum, *principia.*

quemadmodū in bello fieri solet: aut exhalatio paludis cuiusdā, aut stagni tēpore estiuo atq; interdū immoderatus calor circumfluentis aëris est principium, quēadmodum in pestilētia quæ Atheniēses inuasit (vt Thucydides ait, viuentes homines in suffocatis necita, perflatis tuguriis estate corruptio afficiebat. Est autē initiū pestilentis febris, eò quòd humores corporis ex prauo victu sint in putrefactionē parati. Forsitā autē accidit

*† ουεχ' is
aërem.*

id propter † cōtinuitatē, quòd ex Aethiopia fluxerunt quædā mala inquinamenta: quæ iis qui habebāt corpora læsioni parata, causæ febris extiterūt. Huius enim semper me-

*Corporis
præpara-
tio bonam
partem a-
ctionis sibi
uendicat.*

minissē oportet toto hoc sermone, vt nulla causa sine corporis aptitudine efficere possit: alioquin omnes qui in sole diuersantur æstiuo, in febrē inciderēt, & qui plus æquo mouētur, aut bibūt, aut irascūtur, aut mœrēt. Nec secus omnes ægrotarēt circa Canis syderis ortū, atq; in pestilētia perirent. Sed

*Agentis
uirtus ac
passi apti-
tudo.*

(vt est dictum) maxima pars generationis morborū est, afficiēdi corporis præparatio. Subiiciatur ergo pro exemplo in ipso aëre inuchi quædā pestilētiæ semina: atq; eorū corporū quæ versantur in eo, hæc esse vario- rum excrementorum plena, paratorum quidem ex seipsis putrefieri, illa sine excrementis, ac pura, atque addatur prioribus inesse

obf

obstructionem meatuum vndiq; ac plethoram appellatam, ac vitam otiosam in multis epulis, & ebrietatibus, & Veneris vsu immo *Imbecillæ concoctio-* dico, & cruditatibus, quæ omnia prædicta *nis causæ.* necessariò consequuntur. Aliis autem omnibus corporibus puris, ac sine excrementis insit vltra ea quæ diximus cōmoda, quod omnibus spiraculis corporis neque obstructis, neque pressis angustia bene transpirat: exercitatio verò prudenter instituta, ac victus ratio moderata, deinde his ita subiectis, cogitabis num sit verisimile vtraque corpora cōspiratione putridi aëris affici. Nonne consonū est hæc statim à prima inspiratione initium putredinis accipere, vnde in maiorem *† κακωσιν* † noxā plabatur, quæcūq; verò vacua excrementis & pura sunt, ea vel nullo modo, vel *id est no-* exigua labe infici vt faciliè ad habitū naturæ recurrant? Itidem quoties aëris temperamentū ab ipso naturæ habitu immoderatè recessit ad humiditatē & caliditatē, pestilentes fore morbos necesse est: affici autē his maximè, eos qui iam prius pleni fuerint humiditate excrementosa: quæadmodū qui laboribus moderatis ac victus ratione tēperata *Impatibiles ab aëre pestilenti.* vsi sunt, penitus impatientes permanēt p omnes eiusmodi affectiōes. Hic sermo sup vno exēplo dictus est, sed in omni genere causæ ver⁹ est. Ac cui libeat integrè in eo exerceri,

legat librum de causis procatarcticis, id est, externis: Ego verò præsentì libro parcens longitudini, vno capite omnē eū cōprehendens, finē faciā. Oportet enim in vnoquoq; causarū genere scrutantē qua potissimū facultate morbos cōmittere soleat, deinde cōsiderare congruentes, & repugnantes ei dispositiones corporū: scientem vt congruen-

*Facile &
difficile
patibilia.*

tibus quidē prompta læsio est, aduersus autem, ac repugnantibus, quantā vim habeat & magnitudinē contrarietas, tantū inuicti permanebūt. Ipse nanq; vidi nonnunquā eueniente tali cōditione qualē Hippocra-

*Initio. 2.
epid.*

tes in oppido Cranone fieri dixit, carbūculos grassatos nō paucos, quorū generatio & alia omnia eo quo ille scripsit modo, planē fuerūt. Quinetiā quæcūq; tertio libro Epi-

*Conditio-
ne pestilen-
ti quid a-
gendum.*

demion in pestilenti scripsit cōditione, ea etiā omnia per aliā similem illi cōditionē extiterunt. Summa eorū (vt ipse Hippocra-

*Cōmēt. 3.
statim ini-
tio.*

tes dixit) putredo fuit, atq; id ipsi cognoscentes, statim incipiente cōditione quæcūq; corpora vidimus humida, statim quouis modo exiccare tentauimus: quæcūq; verò sicciora, pristinam naturā in his custodiuius: quæcunque verò excrementis plena, purgationibus sanauimus: quascunque verò obstructiones meatuum soluimus, atq; aperuimus. Sed hæc quidē iam quodam modo ad medendi

metho

methodū pertinent, & scilicet in eo opere
 fusissimè dicentur. Nunc autem eorum men-
 tionem feci, sequutus sermonem docentem
 quonam modo ab vna causa exuperāte qui-
 dam præhēdūtūr febre, alii impatibiles per-
 manent. Dispositiones enim corporum dissi-
 miles, multiformesq; sunt: & idcirco quidā
 facilè vincuntur, ac prōptissimè patiuntur à
 causa agente: alii inuicti penitus & impati-
 biles sunt, aut difficulter patiuntur. Ad eius
 rei demonstrationem coacti sumus mentio-
 nem fecisse etiā curationis, perinde vt Hip-
 pocrates facientes, qui alicubi eodem quo-
 dam modo celebre illud verbū adscripsit.
 Id autem sanatio ipsa indicat.

*De præcautione, & quonam modo diaria fe-
 bris ex bubone consistat. CAP. VII.*

PRæcautio igitur secundum talem quen-
 dam modum sanatio est. Quando &
 ipsa nomina sæpenuerò cōfunduntur apud
 medicos. Vt enim alio libro diximus, omnis
 medici operatio corporis ipsius vitia corri-
 git. Sed nihil ad proposita, huiusmodi no-
 minum subtilitate egemus. Siue enim se-
 ces in duo nomina totum id, sanationem ac
 præcautionem, siue in vnum ambo colli-
 gas, sanationem appellans: non paruo ar-
 gumento est, non omnes ab eiusmodi causa

*Præcau-
 tio.*

*Medici of-
 ficiū.*

Epidemio similiter affici, dispositio corporū, quæ pro-
rū morbo hibita sunt corpori epidemiis ac pestilentia-
rum præ- bus morbis. Vnum enim primūq; consilium
cautiones. in omnibus cōmune est, vt corpus maximē
 vacet extrementis & ad trāspiratum habile
 sit, secūdum verō post hoc, vt exuperanti
caulæ repugnet, quoad fieri potest. Quibus

Hic initium
alijs faciūt
7. capit.

Questio.

Febris e-
phemera
generatio.

verō contraria horū insunt, ocysimē patiu-
 tur, maximeq; egrotant. Sed quoniā febriū
 pestilentium mentionē feci, ex putredine o-
 mnium ortū habentium, par est incumbentem
 animo ad hunc sermonē explicandū hoc lo-
 co scrutari de antiqua opinione, omnē fe-
 brem cōsistere ex humorū putredine dicen-
 te. Videtur enim ita sentire ij qui ab Athe-
 næo fluxerunt, nō obscuri quidē viri in hac
 arte, præsertim in ea quæ est de febribus sciē-
 tia: in quibus ego plurimū cū illis sentio, ve-
 runtamen vnum excipio, diarias nominatas
 febres. Nō enim mihi videntur hæ subsequi
 putredinē humorū: sed qui ob æstum febricitat,
 ab ipso efficientis causæ calore altera-
 ri solet. Ob irā verō febricitanti, & ei quidē
 ebullitionē quandā fieri sanguinis in corde
 necesse est, nō tamen putredinē. Necnō per
 exercitationē, caliditatē ampliorē præter na-
 turā sine humorū putredine accēdi, & quis-
 quis cutem habuerit adstrictā, per quā acria
 excremēta euacuabātur, illis collectis febricitat

eltauit sine putredine humorū. Quinetiam febris ex bubone omnis, mala est, excepta *Febris ex bubone duplex, ephemera & putrida.* ephamera, ut Hippocrates dixit: licet etiam bubo ipse inflammationū genere cōtineatur. Atq; assentio in hoc sermōni putredinis, nā ob eam rem ex inflammatione febricitant, nō quēadmodū Erasistratus existimauit. Attamen nonnullae sunt ex bubone febres in genere diarjarū, quēadmodū aliae quaedā nūtiānt nō faciles curatu morbos, ex inflammatione, aut vlcere, aut abscessū, aut aliter quoqiā tali in viscere affectu ortū habentes. Cāterūm dissident febres ex bubone ab iis, quae ex putredine humorū cōsistūt, quae fit aut in aliquo viscere, aut in cauis, ac maximis vasis: quoniam vbi febris ex bubone cōsistit, pars cōtinua semper calefit, ac calor quidē vsq; ad ipsum cor distribuitur: cāterūm putrida fuligo vsq; ad ipsum minimē peruenit, sed ibi manet circūscripta in bubonis loco, per alterationē solam continuatū partiū ad cor perueniēte calore. Quo potissimū modo, etiā per aestū ac per exercitationē ex partibus primō calefactis, distributio ad ipsum principiū vitale fit. Vbi autē putredo fuerit in visceribus atq; in magnis vasis, veluti fumus ex putrescentibus humoribus *Humor cum putrescens.* ad ipsos cordis sinus peruenit. Accidit igitur vt humores in bubone quidem omnes cun-

Et imputrescāt, siue vno die, siue duobus continenter: vtpotē semper inuicem conuersantes & inclusi vno loco: in visceribus autem conditi, & in magnis vasis, vtpotē trāsfluentes semper, ac simul putrefacientes quos attigerint, tempore ampliori putridū accendunt calorem. Sed vt vno verbo dicatur, quēadmodū in exteris omnibus, quęcunque calefiunt præter naturā à quauis causa, si nequeat putrescere id quod calefit, velut lapis, aut lignū, aut aliquod aliud tale, eò vsque perse-

*Calor con
tinuè pu-
trescentia
depascitur*

Analogia.

uerat calidū quoad refrigerit paulatim. Id autem quod putrescere potest, depascentem semper secundum continuitatem habet calorem. Quemadmodum interdum vidi in agro sterco pecudū simul & columborū ex parte quapiam ab ipso sole calefactum ita vehementer, vt multa exurgeret exhalatio, instar fumi ascendens, vehementer mordens atq; afficiens, & si quis propinquasset, oculos & nares lædens. Porro sterco tangentibus erat ita calidum, vt deureret diutius impositas ipsi manus, aut pedes. Non tamē semper id symptoma durabat: sed sequēti die refrigerabatur quidem quātū stercois ad summum feruorē pridie peruenerat: quod autē continuū ipsi erat, tūc succēdebatur, qñ primū sterco in summo feruoris vigore erat: illudq; ipsum (dum hoc inclinabat) rursus

incalebat atque efferuescebat, ac paulò pòst summum feruorē obtinebat, primo refrig. rato, atq; illud rursus inclinabat, dū id quod continuū erat, caloi ē concipiebat: & paulò pòst accendebatur quidē hoc, & ad sumnū feruoris perueniebat, prius autem refrigera- batur. Erat autem hæc circuitio ferè tēpus diei ac noctis: ita vt exēplū sit maximè cō- ueniēs febris quotidianæ. Si verò duobus die- bus ac noctibus dicta circuitio fuisset, exem- plū foret ita febris tertianæ: & si tribus, quar- tanæ, & si quatuor, quintanæ, si modò febris vlla quintana est, ipse enim nondū perspi- cuē vidi, neque eā circuitiōnem, neq; aliquā aliā vltra quartanam. Sed de febribus repetē- tibus per circuitiōnē, pòst dicetur. Putredo autē humorū quæ fit in vasis, similis putre- dini quæ in inflammationibus fit, & abscessi- bus, & aliis phymatis, duplex quidem gene- re est: ex permistione autē duorū generum, alia tertia varia specie existit. Siquidem & mixtionis modi, quum alterū genus maio- ris minorisq; ratione superet & superetur, fa- cilè numerari nō possunt, sed ex duobus ge- neribus alterum quidē fit superante natura, alterum verò euicta. Superante quidem, vt per inflāmationes & phymatosos tumores omnes, pus: in humoribus autem venarum & arteriarum, id quod subsidet in vrina pro-

*An sit qua-
ntana fe-
bris.*

*Hic alij fa-
ciunt ini-
tiū. cap. 8.*

*Putredo
triplex.*

*Pus supe-
rante na-
tura.*

*Substātia
puri pro-
portiona-
bilis.*

por

Putredo concoctione permista. portione puri respondens. Atque hæc putredo non simpliciter putredo censetur, sed etiam habet aliquid concoctionis, manente enim adhuc concoquendi facultate vasorum, putrescens tunc humor ad talem alterationem deducitur. Porro alia est putredo concoquendi facultate adeò debili, ut nulla mutatio ad benignum putrescentis excrementi efficiatur.

Putredinis simplicis cause. Quod sit interdum illa extremè debili: quanvis putrescens humor sit modicè prauus, interdum autem facultas ad extremam debilitatem minime deducitur: sed humor extremè prauus existit. Huiusmodi excrementi putredo, neque consistentiam, neque colorem, neque odorem habet vnum: sed putrescens humor semper secundum substantiam permutatur ac variatur.

Puris & putredinis discrimina. Altera verò putredo quam & cōcoctionem esse diximus, in vnam speciem puris semper mutatur, & colorem, & consistentiam, & odorem.

Quòd pus optimum sit candidum & crassum & minime fetidum, & quòd optima urina habeat sedimentum candidum, æquale ac minime fetidum, & quibus indicis febris diaria cognoscatur.

CAP. VIII.

Pus optimum. **V**BI igitur natura ipsa omnino superet pus optimum gignitur, visu candidum

ac

ac crassum, & sibi simile vndique: læue autē
 tangenti, ac minimè fœtidum. Quod si ve- *Pus multi*
 lut semiputridum fuerit, tertium genus in *forme.*
 tali mutatione (quod paulò suprà diximus)
 consistit. Porro diximus tale genus maxi- *Abscessus*
 mè multiplex esse. Nam quod magis ac mi- *urina,*
 nus recipiat concoctionem, innumerabilis *sunt pro-*
 differentia est. Sæpè enim candidum esse. *portiona-*
 ctū, aut fœtidū est, aut tenue consistentia: *les.*
 quandoque verò non candidum, sed liuidū
 apparet, atque in omnibus his magis & mi- *Optima*
 nus est infinitū. Cæterū quot in abscessi- *urina.*
 bus putredinis differentia sunt, tot in feбри- *† τὸν ἰα-*
 bus ex putredine accensis † vrinarum formæ *τροπὴν*
 existunt. Optima enim quæ putrido humo- *καὶ τοῖς*
 re ea virtute quæ continentibus vasis insita *ὄψεαι, id*
 est, candidum, læue, æquale, ac minimè fœ- *est eorū*
 tidum sedimentum habet. Pessima verò, *quæ in uri-*
 maximè contraria huic est. Ea verò quæ me- *nis inuehi-*
 dia est, quod magis alteri earum propinquet, *tur, quæ*
 tantò melior aut deterior est. Sed de vrina- *hic ἰατρο-*
 rum differentia † libro de iudicationibus do- *μενα, alio*
 cuimus. Febres autem accensas ex putredi- *loco πα-*
 ne humorum, alias à diariis esse existi- *εῖν ἰατρο-*
 mare oportet. Atque harum agnitio ne- *να, nebule*
 quaquàm difficilis est: quamvis impossibilis *sunt subli-*
 mamenta,
 & sedimenta. Nam urine substantia in liquore est, acce-
 dunt autem ἰατρομενα. † Lib. I. cap. 12.

quid

quibusdam esse videatur, idq; re ipsa millies
 indicauimus, prima occasione sedata, lotum
 ac modicè cibatum ad solitas operationes re-
 dire præcipientes: ceu postea nō febricitatu-
 rum, & ita accidit. Vnū igitur ac primū indi-
 cium febris diariæ, est ab aliqua causa præ-
 gressa incepisse recenti, atq; euidenti: quam
 consueuerunt omnes medici iuniores appel-
 lare causam procatarticā, id est, prægres-
 sam. Sed id quāuis inseparabile sit ab huius
 modi febribus, earū proprium minimè est:
 quoniā & aliæ nōnullæ incipiunt causa qua-
 dam euidenti prægressa. Inseparabile verò
 & propriū est, vrinæ cōcoctio statim primo
 die: & ad hæc, pulsus in magnitudinē ac ce-
 leritatē insignē auctio, ita vt frequentia per
 exteriorem quietem, minimè seruet propor-
 tionem. Magis prætereā proprium, atq; inse-
 parabile earū indicium est, quodd cōtractio mi-
 nimè crescat in celeritatē: vel si crescat in-
 terdū id minimū est, ac cognitu difficilē, &
 paulū à pulsu naturali recedēs. Quinetiā
 caloris suauitas propriū atq; inseparabile est
 taliū febriū. Inseparabile verò & æqualitas
 & ascensus liber tum in caliditate, tum in
 quabili. pulsibus, non tamē propriū est. Etenim qui-
 busdam aliis inest: quemadmodū & status
 clementia, neque enim id propriū est, quan-
 uis his potissimū insit. † Ac melius quidem
 fue

fuerit hæc quæ cōmunia sunt, quòd per in-
 clementiũ ac vigore diariis præcipuè insunt;
 inter propria reponere. Sit enim ita, quãuis
 † non rei species, tamen optimum certissi-
 mumq; talium febrium proprium simul at-
 que inseparabile indicium:quemadmodum
 inclinatio quæ cum sudore aut madore, aut
 penitus vapore quodam suavi est, quã inte-
 gritas perfecta excipiat. Atq; his indiciis fe-
 bres diariæ, promiscuè cognoscuntur. Sed de
 singulis seorsum secundum speciem agetur.

Quibus indicijs cognosci conueniat febrẽ pu-
 tridam, ac de duritiẽ pulsus nonnulla contra Ar-
 chigenem.

CAP. IX.

ALIVD autem genus febrium, quòd ex
 aduersum diariis diductũ est, nullum
 nomen commune omnium habet. Differen-
 tiæ autem primæ duæ existunt, non obscu-
 ris speciebus definitæ, quædam enim ex eis
 putredine humorum accenduntur; aliæ ve-
 rò partes ipsas animalis solidas occuparunt:
 atque appellant eas heceticas febres, vel quia
 stabiles sunt ac solutu difficiles, quemadmo-
 dum habitus, vel quia ipsum corporis habi-
 tum occuparunt. Ita nanquẽ solent nomi-
 nare solidas partes ex aduersum diductas
 humoribus. Febres igitur humoribus accen-
 sæ cognoscuntur ad hunc modum. Primum

nia quidẽ,
 secundũ in
 clementa
 & status,
 melius est
 propriapo-
 nere, quia
 diarijs
 præcipuè
 insunt.

† Etenim
 ex proprie-
 tate quæ
 omni soli

& semper
 inest, spe-
 cies rei cõ-
 stituitur.

Febres pu-
 tridæ.

Febres he-
 tice.

igitur indicium, proprium quidem sed minime inseparabile est, quod nulla prægressa causa tales præcessit febres, neutri enim aliorum generum hoc inest: eo quod omnis diaria ex causa prægressa consistat. Hæctica autem quoties sine ea existat, nunquam ab initio præhendit, quocirca quoties sine prægressa causa quis febricitare coeperit, causam huius esse in humoribus, sciendum est. Sed interdum causa quæpiam euidens prægressa, diariam febrem, quantum est in seipsa, committens, febrem ex humorum putredine excitavit, quoties affectum corpus ita se habet, id est, quoties impurum, excrementosumque est.

Diaria in putridam abitio. Vbi enim excrementa per diariam febrem plus æquo calefacta fuerint, deinde initium putredinis inde susceperint, alterum febrium genus accedunt, priore sedato. Sed interno scitur successio talis febris indicio proprio simul atque inseparabili: quod febris diaria nequaquam desinat ad exquisitam integritatem. Accidit enim interdum, ut per consistendi vigorem diaria transeat in putridam: ac multo magis per inclinationem, quoties (ut paulo ante diximus) maxima tranquillitas febris abest, quæ adesse deberet. Hæc sunt transitus

Rigor inter initia. indicia. At verò febrem ex rigore incepisse, nequaquam prægresso estu vel frigore forti (qualè maximè patiuntur, qui per hiemem faciunt

ciunt

ciunt iter, vel alio modo in vehemēti frigore diuersantur diutius) proprium est & hoc febrium putridarū, sed haudquaquā inseparabile. Neq; enim omnibus ipsis, quēadmodum nec horror, inest: is enim nō solum non inseparabilis est ab huiusmodi febribus sed nec vllō pacto proprius est. Cāterū pulsum atque etiam calorem inæqualē esse, siue per initia accessionum, siue per incrementa, talium generi febrium proprium est, sed haudquaquā inseparabile (multę enim etiam siue inæqualitate sensibili incipiunt, atq; ad statum perueniunt.) Iam verò multò minus illud inseparabile est, quòd accessio multas habeat inuasiones: quod † repetere accessiōē appellamus. Quemadmodum quod pulsus † arctior sit (ita verò dicunt, vbi incipiente accessione paruus admodum & inæqualis existat) neq; id taliū febriū inseparabile est: non tamen cōmune est alteri vlli generi febriū, sed harum proprium, quēadmodum ipsa inæqualitas, vbi alicuius symptomatis ratione non accidit. Sæpē enim in ipso ore ventriculi collecto quodam prauo humore ac mordaci vel frigido, paruus simul inæqualisq; existit. Sed vbi frigidus humor sit, paruitas: vbi mordax, inæqualitas ipsa exuperat. Sed vomētibus, hæc ambo statim desistunt. Vbi verò ventriculus nihil

Horror.

Calor pul-
susq; inæ-
qualis.

Repetere
accessio-
nem.

† τι πιπρω
ξυνεδοι.
† θλιψις.
Pulsus ar-
cticus quid
est.

Parui in-
æqualisq;
pulsus cau-
sa.

eiufmodi patitur, prædictarū generis febriū
 talis pulsus existit. At verò maximum indi-
 cium febrium putridarum, est caloris qua-
 litas. Nihil enim suaue, neq; moderatū, ne-
 que diariis simile habet. Sed quēadmodūm
 optimi ante nos medici dixerunt, mordax
 potius quodammodo est, vt offendat, mor-
 deatq; tactū, veluti fumus oculos, ac nares.
 Verūm inter initia accessionū (dum adhuc
 suffocatur calor, ac succēdūtur intus excre-
 mēta) nō statim immittētibus manū digno-
 scitur: sed diutiūs immorātibus prædictum
 caloris genus de profundo emergit. Ac (vñ
 mihi videtur) quū tale aliquid vidisset The-
 mison propriū atq; inseparabile esse omni-
 bus febribus existimauit. Sed de his suo lo-
 co rursus agetur. Prædictū autē genus calo-
 ris perpūgēs (vt ita dixerim) aut erodēs (ve-
 luti medicamentū aliquod acce) impositam
 manū, putredinis humorū soboles est, per-
 spicuē per incrementa accessionū, atq; vigo-
 res febrium apparens: non tamen statim per
 initia accessionum perspicuē existit. Pro-
 prium prætereā inseparabile est generi fe-
 brium ex humorum putredine infestātium,
 velocitas contractionis pulsus, euidentior
 quidē per incrementa, sed minimē obscura
 per ipsos vigores, atq; initia accessionū. Co-
 mutatur autē has per initia, paruus simul ac
 vel

velox pulsus: per vigorem autē, magnus si-
 mul ac velox. Nec secus frequentia ipsa per *Frequentia*
 exteriore in quietem perspicua est in eius- *per exte-*
 modi febribus, neque diartisi, neque hecticis *riorē qui-*
 similis. Maxime proprium præterea est ta- *tem.*
 lium febrium, urinae cruditas, atque obscura *Urinae cru-*
 concoctio, proprium indicium est febrium *ditas aut*
ex humoribus consistentium. Neque enim *obscura*
 cruda, neque obscure concocta in febribus *concoctio.*
 diariis existit. Atque alterutra quidem earum
 seorsum dicta propriū est febrium putrida-
 rum indicium: sed ambo simul dicta † per
 ipsam enunciationis disunctionem, penitus
 inseparabilia sunt. Quoniam primæ urinae in
tali febrium genere, vel penitus crudæ, vel
obscurè concoctæ existunt. Magnum verò,
atque insigne indicium concoctionis in pri-
mis vrinis nunquam existit per huiusmodi fe-
bres, nisi à diariis in has transeat: id quod
 paulò antè docuimus. Cæterum ab his quæ
 diximus indicis propositarum febrium, id
 quoque existit, si per ipsum accessionis vigo-
 rem, symptoma quoddam ardētis febris ex-
 titerit: quemadmodum si quod epiale, ac li-
 pyriæ, vel semitertianæ, vel typhodis, vel al-
 terius talis febris symptoma fuerit: quæ pro-
 pria quidem sunt generis febrium ex putre-
 dine humorum consistentium, nō tamē in-
 separabilia, & ob eam rem, si quidē hæc mi-

† κατὰ τὴν
 παρα-
 δεικνύ-
 μινον ἀ-
 ξίαμα.

*Inclinatio
nō desinēs
ad integri
tatem.*

*Pulsus pri
ma die du
rus.*

nimè adfuerint, ex aliis indicium quæredū:
si verò adfuerint, non solū genus taliū fe
briū, sed & species vna aliqua ex ipsis signi
ficatur. Quòd si inclinatio minimè desinit
ad integritatē, siue per sudorem, siue etiā ali
ter fiat, alterum è duobus erit, aut indicium
quòd transeat in alienā febrem, si superiora
omnia diariæ fuerint indicia: sin nullum ex
his fuerit, febrē quandā ex humoribus cōsi
stentē statim ab initio præhēdisse ostēditur.
Vbi verò pulsus prima die durus existat, cō
siderandum num concretio quædā ex fri
gore, an siccitas, an tensio cōuulsifica in cor
pore laborantis, an inflammatio quædā, an
scirrhus sit: scientes quòd ex his tātummo
dò pulsus durus efficiatur. Nam Archigenis
errores circa notionem, cognitionemq; du
ri pulsus, in opere de pulsibus abundē do
cuimus, in quo versatus sit oportet, qui ad
hæc legenda accedet: ac potissimū in ea
parte quæ de pulsuum dignotione agit. Et
enim pulsuum ipsorum nomina ac signifi
cata ab eis omnia, omnemq; numerū vno vo
lumine indicauimus: quod quidē inscripsi
mus de differētia pulsuū. Sed quonā modo
vnuinquenque conueniat dignoscere, alio
volumine diximus in quatuor libros distin
cto, quod inscripsimus De dignotione pul
suū. Quēadmodū alios deinceps quatuor
lib

libros de causis pulsuū effecimus: & itē quatuor ab iis dictis de prænotione expulsi-
 bus: non solum verbis, sed etiā re ipsa indicātes
 huius sciētiae vtilitatem. Et si quis nobiscū
 vnā accessit ad ægros horum librorū specu-
 lationem re ipsa ostendētibus, cūm cætera
 ei persuasa sunt, tūm verò etiā illud, nō esse,
 videlicet durum pulsum aut propriū talium
 febrium aut inseparabilem. Sed de hoc nunc,
 non est dicendi locus: nam prædictis libris
 diximus, & aliis octo libris quibus expendi-
 mus librum de pulsibus Archigenis, abundē
 huiusmodi symptomata docuimus: hoc lo-
 co quod sit necessariū tantūmodò indicabi-
 tur. Pulsus durus, neq; proprius est, neq; in-
 separabilis cuiuspiam generi febriū, neq; dia-
 riæ, neque putridæ, neq; hæcticæ. Sed hæcti-
 cæ inest magna ex parte, atque interdum in
 aliis duobus generib⁹ ob symptoma quod-
 dam existit. In diaria quidem, quoties febris
affligat ob refrigerationē fortem, vel tēsi-
quædā neruosa insit: atq; interdū efficitur
ob æstum fortem, vel lassitudinē simul, vel
inopiā alimēti, vel vigilias immodicas, vel
euacuationem: quoties ob alimenti defe-
ctum hæc quoq; constiterint. Per febres au-
tem putridas pulsus quoque durus habetur,
quoties in viscere inflammatio fatiget, vel scir-
rhus: & ob symptoma aliquod coniunctum,

*Pulsus du-
rus.*

*Febris hæ-
ctica.*

*Pulsus in-
diaria du-
rus.*

*Pulsus in
febre pu-
trida du-
rus.*

nempè aut neruosam aliquam tensionē, aut siccitatē, durus quoque sic pulsus euadit, velut & iis qui intēpestiuè frigidam biberunt, aut eadem lauerunt : vel † fructus quosdam largiter comederunt. Sed pulsus durus nunquam efficitur per ipsam febrem, quā febris est: neque per ipsam diariam, neq; per ipsam putridam, neque enim quoties ex inflammatione febris affligat, eodem modo febris ac pulsus durities comitatur: sed febris quidem sequitur putredinē humorum: durities autem tensionem ex repletionē vasorum. Nā

Duritie (vt semel dicatur) durities tunicis arteriarū
pulsus cau accedit, vel propter concretionē, vel tensionem, vel siccitatē. Concretionē igitur re-
sa. frigeratio vehemens committit: tensionem

Duritie verò inflammatio, ac scirrhus, atque etiam
arteriarū neruorum proportionalis inflammationi-
causa. bus dispositio: siccitatē verò euacuatio-

Cōcretio nes diutinæ, vel ob alui fluorem, vel laxita-
nis causa. tem intestinorum, vel difficultatem intesti-

Tensionis norum, vel vomitū longum, vel aliud istius
causa. modi, & fames diutina, atque ardentes fe-

Siccitatis bres diutinæ, & (vt in totum dicatur) quæ-
causa. cunque vehementer exiccant ipsius anima-

Hectica. lis partes solidas, velut & hecticæ: de quibus nunc dicere fuerit tempestiuum, ab earū generatione exorsis.

Quibus indicijs febris hectica cognoscatur, & quon

quonam modo cōsumpto admodum humore cordis dispositio efficiatur, quam Philippus nominat ex morbo senectam.

CAP. X.

F^{EBRIS} igitur ~~hectica nomine efficitur~~ *hectica fit duobus* tur duobus modis, magna ex parte ob febres ardentes, quæ prorogantur adeo, ut cōsumat spacio tēporis humorē corporis cordis, *modis.* vel etiā si adhuc multus permaneat. Illa igitur nō solū *Post ardētem febrē marcor.* hectica, sed etiā marasmodes iā existit. Hæc verò quæ manēte adhuc humore fit, corpus ipsum cordis præhendens, indè maximè acceditur: quæ admodum lucernarum flamma ex ellychnio. Atque vna quidem eius generatio est prodita. Reliqua autem est, quoties statim ab initio præhendat, *hectica ab initio præhēdēs.* primam generationem similem habēs diarræ ob mœrorem, iram, lassitudinem magnam cum vstione contractam. Hæc igitur *hectica curabilis.* febrem sanare nequaquam difficile est: quæ verò ex eis deuenierit in marasmm propter inscitiam eorum qui adhibiti sunt medicorum, eam sanare non solum non facile, sed etiā impossibile est, quoties planè iam confirmata fuerit, nec prætereà incipiat. Natura enim eius calida ac sicca existit, ac cor similiter afficitur, ut ellychniū in lucerna, quoties plurimum creinatum fuerit. Etenim ita exustum friabile fit, atq; dissolvitur, perdi-

turq; cōtinuitas præ ariditate : vt neq; si af-
fundas abūdè oleū, queas rursus accendere
flammam copiosam. Parua enim atq; infir-

† Περὶ - ma flammula in ipso † concutitur, ac semper
ἐπιπείσσει minor efficitur, vsquequo extinguitur. Atq;
alias πρὸς - exactè quidē marasmodēs febris huiusmo-
δι existit, nec eadem est cum affectu marco-
ριωσέει re. Hic enim in iis efficitur qui cōsenuerūt si-
τῶν disper gitur. ne febre, extincto in illis natiuo calore (quæ
Febris ma potissimūm mœrore vacua mors est, ac se-
rasmodēs. cundū naturā ex siccitate cōsistens) velut &
Marcor. in iis qui emarcēt præter naturam, genus il-
lud efficitur, quod Philippus nominat ex
Mors sine morbo senectam. In quam multos nouimus
mœrore. non senes solum, sed etiam pueros incidisse.
Ex morbo Febris autem marasmodēs non solūm sicca,
senectæ. sed & calida affectio est. Extinguitur autē
Febris ma per eā multò celerius calor in animali, atq;
rasmodēs tabescit totum corpus instar arboris in ple-
calida est num arefactæ, vel ob temporis lōgitudinē,
& sicca. vel flammæ vicinitatem, vel fortē atq; im-
Analogia. moderatum squalorē. Sed de tota marcoris
affectione, seorsum diximus. Hecticæ autē
febris, cū duplex eius genus sit, vt antē di-
ximus, indicia deinceps explicabimus.

De febre hectica, & quòd diaria sæpenumerò
transmeet in hecticam : cuius rei indicia multa
existunt.

C A P. XI.

Feb

FEBRIS igitur hectica cum marcore
 coincidens, promptissimè ac facillimè
 cognosci potest. Prius enim quàm tangas
 pulsum atque calorem, oculos supra modum
 cauos videbis, quasi in fovea quadam condi-
 tos, ob totius humidæ eorū substantiæ con-
 sumptione: ita, ut ossa quibus palpebræ an-
 nexæ sunt, promineant. Quinetiam lippitu-
 dines in eis visuntur aridæ, ac quædam squali-
 da dispositio, qualis maximè inest eis, qui
 per puluerem multum tota die in sole cali-
 do fecerunt iter. Flos ipse præterea viu-
 cidus coloris perit, atque id toti faciei accidit, &
 immoderatus squalor habetur totius cutis
 circa faciē, maximeq; circa frōtē: ita, ut pro-
 pter siccitatem, sicca arq; intenta sit, non ta-
 mē quàm palpebras ipsas multum attolle-
 re, perinde affecti semper ut qui dormit viuit.
 Quinetiā conuiuet magna ex parte, quæ ad-
 modum qui dormitant. Est autē talis affectio
 nequaquam somnus, sed impotētiā vigilandi.
 Carnes præterea cōsumptæ sunt circa tēpo-
 ra, ita ut ea loca collap̃sa, cauaq; appareant.
 Nec quicquam aliud omnino quàm ossa, ac
 cutis sunt: ita, ut si eos nudos perspicias, invē-
 tre nullū superesse intestinū, nec vlla visce-
 ra, atq; hypochondria ipsa retracta esse ad
 thoracē admodum videātur. Quod si libeat
 illos tangere, cutis quidem perquam sicca

Hectica.

cū marco-
re indicia.Oculi con-
caui.Palpebra-
rū ossa pro-
minentia.Lippitudo
arida.Squalida
dispositio.Color sine
flore uiui-
do.Frōs sicca
intētaq;.Affectio
somno si-
milis.Impotētiā
uigilandi.Tempora
collap̃sa.Totiū ossa
& cutis.

Hypochondria ad thoracē re tracta. existit:& vbi attollas apprehēdens digitis, quasi corium quoddā stat. Pulsus autē gracilis, durus, debilis, ac frequēs habetur. Calor autem in primo quidē occurſu debilis, sed paulò pōſt acer atque erodens apparet: **Cutis taſſu ſicca et quaſi corium.** maxime quē vbi tangendo diutius immoraris. Sed minimē cōuenit reliqua indicia cōmemorare in re tam perſpicua. Itaque ſatius eſt, vt ad ipſum marcorē adhuc incipientem veniamus. **Pulſus.** Marcor ergo incipit, quoties humor inſitus in vnoquoq; corpore diſperſus per loca media partium ſimilarium, ex quo mēbra primū alūtur, ferē in ipſo corpore **Calor.** cordis nullus amplius ineſt. Quouſq; enim

Hēctica ci tra marcorem. aliquid ipſius ſeruatur, hēctica febris tantūmodō eſt, nondum tamen maraſmodes. Vbi

Hēctica difficilis. verō ferē nihil inſuper huius humoris exiſtit, exquiſitus iā marcor cōſiſtit. Difficilis

Hēctica principii. ergo cuiuſlibet hēctica febris diſpoſitio eſt, quoties ipſius principii tempus præterierit.

Hēctica generatio. Definitio autem principii, nō dierū vel horarū numero: quēadmodū neq; in cæteris morbis, ſed ipſa qualitate diſpoſitionis, et enim dum corpus ipſum cordis diſcedit ab ipſa tēperie naturali, nō ſtatim inſit^r humor perit, neq; facultas debilitatur: ſed in primis velut ebullitio quædā efficitur ipſius humoris quo tempore talis febris facillimē curatur: quippe quòd facultas nihil dum perpeſſa eſt.

est. Deinceps autem consumptio quædã fit Humide
 ob ebullitionẽ, eaquẽ ipsa amplius iam pro- consum-
 cedente, ipsa etiã corpora similia, quæ ve ptio.
 lut elemẽta cordis existũt, sicciora euadũt, Similiariũ
 minusq; alimenti sentiunt: ac facultas debi- exarsio.
 lis redditur tantũ, quantũ siccitas ac calidi- Hectica
 tas in eo exuperat. E quibus alterũ sufficiens triplex.
 erat, vt exuperans infirmã redderet faculta- Hectica
 tem. Talis febris iam quodammodo in medio media.
 genere ambigit, ac media est insanabilis pe- Marcor
 nitus illius marasmodis, eiusq; quam paulò incurabi-
 antẽ diximus, adhuc incipientẽ facillimẽ lis.
 posse curari. Atq; in ea perquã multa latitu-
 do existit, quoniam non parua affectionis
 ipsius permutatio maioris minorisq; ratio-
 ne est, Itaq; quoties ab vtraq; febre discedit
 æqualiter, ab exquisita scilicet marasmode,
 eaq; quæ nõdum quippiã eiusmodi habet,
 media quodãmodo est, & ad curationẽ am- Ambigēs.
 biguum habens vtroque versus momẽtum, Propior
 Quæ autẽ marasmodi propior est, iam peri- periculo.
 culo propinquat: quẽadmodum priori alte- Spei pro-
 ri propinquior, spem obtinet non parua fa- prior.
 nitatis. Sed tempus est vt ad earum indicia Hectica
 transeamus: & primũ quidem illius quam incipiens
 posse facillẽ curari docuimus, nisi in vulgarẽ sola.
 quẽpiam medicum incidat. Est autẽ, vbi Putrida
 sola cõsistit, nequaquam difficilis cognitu: implexa.
 implexa autẽ cuipiam putrida, deprehē- su dif-

su difficilis iam existit ob permixtionē. Sed
 primā subiiciamus ipsam solam ex quadam
 causa prædicta consistere, atque appareant.
 in ea prima die cuncta indicia febris diariæ.
 Simul igitur cum eis apparebit statim causæ
 prægressæ genus, atque id indicabitur pro-
 cedente oratione. Sed interrogādo ægro-
 tum ipsum licebit discas, si aliis in rebus non
 malè affectus, ex ira forti tantummodò, vel
 mœrore, febricitare incepit. Quòd si videā-
 tur hæc ita se habere, febrisque extendatur
 usque in secundum diem, nequaquam desi-
 nit ad integritatem: sed neque vehemen-
 tior euadens, si squalidior quidem appareat,
 suspicari hecticam fore talem debes. Quòd
 si tertio die sine cibo transmittere voluerit
 suspectas horas accessionis, quæ tertio quo-
 que die præhendere solet, ac neque additio
 vlla facta sit, neq; minutio insignis: sed pri-
 mæ febris parvæ reliquæ extendantur, per-
 maneantq; cum squalido corpore & calore,
 miti quidem in primo occurso manus appa-
 rente, moranti autem diutius acri, mordaci
 & squalido occurrente, talem febrem hecti-
 cā esse existimare debes. At verò maximū
 tibi atque certissimū indicium erit naturæ
 eius nutrito homine, quādo certissimè vide-
 tur transiuisse omnes horas suspectas. Sta-
 tim enim à cibo post vnam horam vel alte-

ram, omnibus tangentibus ægrum, alterum
 incrementū febris ipsa habuisse videbitur.
 Nec deerit qui increpet tanquam intempe-
 stiue dantes cibum, & ipso potissimum tem-
 pore accessions, & dicat diutius fuisse expe-
 ctandum, & tardasse accessione. Sed res nō
 ita se habet. Cuilibet enim hecticæ febris
 proprium inseparabile id est, vt ingesto ci-
 bo calor accendatur, pulsusque in magnitu-
 dinem ac velocitatē increseat: ita vt æqua-
 lis esse accessio videatur. † Aequalem autē
 accessione voco, in qua nec horror extitit,
 nec frigus extremorum, neque somnus, ne-
 que pigritia insignis, vel inæqualitas quæ-
 dam penitus, vel in calore, vel in pulsū, imō
 nec etiā paruitas, neq; débilitas, neq; aliud
 huiusmodi quicquam, sed tanquam alii cui-
 piā nutrito pulsus maior statim ac velocior
 redditur. Accidit autem interdū & in aliis
 quibusdam febribus incrementum † æquale:
 & quod quidem ex ipso est, videbitur mi-
 nimè esse hecticæ febris symptoma pro-
 priū inseparabile. Sed non parum differt, si
 ad vniuersam dictorū indiciorū collectio-
 nē respexeris. In omnibus enim aliis febi-
 bus tales accessiones æquales existūt, etiam
 citra alimentū ingestum. In hectica autem
 penitus contrarium euenit, nullo enim tēpo-
 re accessio præhendit, sed vna continua fe-
 bris

tis, diutius
 immorati
 mordax.

Ingesto ci-
 bo post ho-
 ram calor

et uelut
 æqualis ac-
 cessio.

† ἄθλι-

πικρ.

† ἄθλι-

πικρ.

Æqualis

accessio

quid.

Æqualis

accessionis

discrimi-

na.

† ἄθλι-

πικρ.

Hecticæ

continue

differentia.

bris est, velut ea quæ synochos, id est continua propriè nominatur. Sed hæc quidè quasi flammam quandam permultam occurrentem habet imponentibus manum: prætereà pulsus quoque velocissimus, frequentissimus, maximusq; ei existit. In febre autem hectica, neque caloris multitudo occurrit, ac pulsus tantò minor, rarior, tardiorq; est, quàm in synocho, id est, continua, quantò calor

Hecticarū ipse minor habetur.

febriū cō-
munia.

Exiguitas
æqualitas
à primo
initio.

Siccitas
cui sit pro-
pria.

† λοιμῶ.

† ἀλλί-

πῆς.

† ὁλίγη.

Hectica
ab alijs ha-
bentibus æ-
qualem ac-
cessionem.

De indicijis cōmunibus cuique hectica febre,
et quam ob causam post ingestum cibū calorem
ipsam augeri contingat. CAP. XII.

COM MVNE igitur cuiusvis hectica fe-
bris est, vt exigua sit atque æqualis
semper, à primo initio vsque ad vltimū fi-
nem. Proprium autem eius quæ tibi affinis
existit, siccitas est: quoniam hectica febris
sæpenumerò sine siccitate consistit, nequa-
quam transiens in marcorem, qualis etiam
nunc multis in magna penuria contigit, fe-
bris igitur hectica dissidet à synocho, id
est, continua: quemadmodum dictum iam
est. Ab alijs autem habentibus accessiones
æquales, eò ipso maximè dissidet, quòd
in æqualitatem quandam illæ omnino ha-
beant post alimētum sub ipsam accessionis
præhensionem: hectica autem post alimen-

tura

tum velut accessio quēdā æqualis cōtingat: *Differen-*
 quæ (vt paulò antè docui) minimè accessio *tia.*
 habetur, sed imperitos circa talia decipit ob
 caloris, tum multitudinē, tū magnitudinē,
 velocitatemq; pulsus. Talis autē febris se-
 quēti die planius cognoscetur, si diligētius
 obseruaris, quandiu permaneat post cibum
 ipsa pulsus, calorisq; alteratio. Inuenies
 enim tādīu permanere omniū quæ manife-
 stè apparent alterationē, donec distributio
 alimēti, atq; adiectio, squalorem cordis hu-
 mefaciat: deinde rursus ad pristinum redire
 statum, qui erat antequā sumeret alimen-
 tum. Si igitur alio tēpore nutrias ipsum se-
 quēti die, rursusq; alio tempore sequēti die,
 inuenies ita fieri, vt dixi, augeri quidem ca-
 lorem post cibū, pulsūq; ipsum, vt dictum
 est, alterari. Constat enim illis id accidere,
 quod calci ac lapidi calefacto. Si enim eis
 affundas frigidissimā aquā, multò calidior-
 es sentiuntur, tanquā calor squalidus in eis
 ab humida substātia nutriatur. Quæ autem
 causa sit ob quā ita eueniat, quæstio natura-
 lis existit; sed quòd ita efficiatur, cuius tēta-
 re volenti discere licet. Vbi enim manibus
 sumas glebulā calcis, cōtemnes eius calidita-
 tem, ac minimè senties. Vbi verò deponens
 ipsam humi, affundas illi aquam, perspicies
 statim admodū calefieri, atq; adeò feruere

*Hectica
non habet
accessio-
nē, sed alte-
rationem
huic simi-
lem.*

*Alteratio
nis mora.*

Analogia

vt lebetes, quoties in multa flamma versentur. Videbis prætereà vaporē ab ea haud exiguum efferrī: quòd si audeas tangere, facìle deureris. Ad hūc igitur modū ad ipsum sen-

Humidus calor magis sentitur.

sum, humidus calor nō paulò habet vim cui dētiorē quam siccus. Cæterū quòd calor siccus existat per hecticā febrē cui succedit marcor, hinc discas licebit. Nemo statim ab initio præhensus est tali febre: qui corporis habitū habuerit humidū: sed qui siccior natura existit, maximeq; vbi calidus quoq; natura sit, & qui vitam delegit in labore, vigiliis, cura, ac victu tenui, is affolet statim ab initio præhēdi hectica febre ex ira, ac mœ-

Siccitatis hectica marasmodi argumenta.

rore: ac multò magis, quoties æstas, & cōstitutio calida ac sicca, locusq; eiusmodi fuerit. Principiū autē eius terminatur, quoties eo tēpore quo diaria per inclinationem mitiorem deducitur ad integritatē, ad eò nihil eiusmodi ipsi accidit, vt siccitas perspicuē intēdatur: tūc enim primū succedēs diariæ, hectica iam efficitur. Definitur prætereà aliter eius incrementū atq; perfectā generatio per accessionē tertiæ diei. Si enim (vt paulò antè diximus) eo die alia accessio minimē præhēdat, neq; æger sine febre existat, sed siccitas ipsi cōstanter intendatur, talis febris haud dubiè iam hectica est, ac processu tēporis marasmodes siue mora euadet, nisi rectē

Principiū hectica.

Hectica perfecta nota.

curetur. Definitur autē ab itio eius in tabē, *Abitionis*
 cū primū pulsus debilis simul ac durus est, *hectica in*
 continuoq; parvus ac frequens is necessario *marcorem*
 est, nō tamē propter eā marasmodies existit, *nota.*
 sed propter debilitatē ac duritiem. At verò
 debilitas accidit ob fortem cordis intempe-
 riem: durities autē, ob siccitatem: quòd si ta- *Pulsus du-*
 les affectus prahendāt cor ipsum, marasmo *ri & debi-*
 de febre detineri animal tūc necesse est. In *lis causæ.*
 eandem præter eā febrem incidunt ex acuta
 atq; ardenti plæriq; eorum qui malè curan-
 tur: maximeq; quicūque vbi frigidā aquam *Febris ar-*
 bibere postularent, adeò nihil eiusmodi bi- *dētis in he-*
 berunt, vt nec vllum aliud in frigidās reme- *ctica abi-*
 dium thoraci atq; hypochondriis adhibue- *tionis cau-*
 rint. Quòd si adeò nihil eiusmodi adhibue- *sa.*
 runt, vt insuper cataplasmatibus ex melle plu-
 rimū vfi sint, quæ nūc frequēti in vsu sunt
 amplius in marcorem incurrere his prom-
 ptum est, siue solū febricitent, siue ex ieco- *Viscerum*
 ris aut ventris inflammatione. Maximè enim *inflamma-*
 his inflammationibus haud rectè curatis suc- *tionibus.*
 cedit marcor: ita, vt quidā existimarint non
 aliter posse fieri huiusmodi affectionem,
 nequaquam scientes, quòd neutrum ho-
 rum, nec aliud quodquam viscus, aut mem-
 brum, neque marcorem, neq; penitus hecti-
 cam vllam febrem cōmittat, priusquā (vt *Hectica*
 diximus) cor ipsum afficiatur. Talis igitur *occafiones.*

† ἡμπερ-
μοι.
† φθόως.

affectio ei incipit, interdum ex seipso, ut ex ira ac mœrore sorti, & longo: interdum ex febre ardenti: quãdoque verò ex affectibus pulmonis, ac thoracis, maximeq; † purulētis ac † tabidis. Vt autem ex his, ita accidit ex ventre ac iecore: & ut summam dicatur, quavis diutina inflammatione in parte principe simul cum siccitate totius animalis, maximeq; cordis. Ego nanque vidi inflammationi laxioris intestini diutinæ succedere marcorem, ac stomachi, ac vesicæ, ac renū, fuerūt autem nonnulli qui affecti erant difficultate intestinorum tali febre correpti, quum scilicet laborassent inflammatione intestinorum. Atque etiā leuitates intestinorum. & fluores intestinorum diutinos, quoties statim ab initio, aut tēpore procedente febris exigua incidit, marcor ipse subsequitur, & ut in summa dicatur, quoties præexistatū cordis ipsius corpus, febrilem calorem suscepit † solum difficilem.

† δυσλειτουργ.

Maximum indicium esse febris hectica, quoties arteriæ ipsæ sint calidiores, quàm corpora quæ circiter sunt, & quòd non oporteat solū circuitionem, sed ipsum febrium genus considerare.

Arteriæ
alijs parti-
bus cali-
diores.

CAPVT XIII.

Maximum itaq; signū febris hecticæ est, quoties arteriæ ipsæ sentiūtur calidior

Idiotes quàm corpora, quæ circiter sunt: quod per alias febres illis minimè accidit. Fit autè symptoma adhuc euidentius ubi laueris, aut alio quouis modo rarefeceris, ita ut humor quidam profluat, atque calor ipse perspiret. Calor enim moderatus in aliis partibus omnib⁹ post talè perspirationè apparet: in ipsis autè arteriis nequaquàm minor est priore. Is verò quàm maximè exquisitè sentitur per pulsum diastolas, qui minimè mutatur post dictà expirationè: sed similis penitus permanet. Sola ergo còsistens hec *Hectica febris putrida implexa.* ca febris perspicua est, siue absoluto sermone hectica, siue etià marasmodies sit. Vbi verò cùm alia quapiàm fuerit, difficilius iam cognoscitur: quemadmodum quæ nuper mulieri cuipiam accidit, cui non solùm die, sed etià nocte non obscurè fiebat accessio. La- tuit enim marasmodies febris omnes qui eam visitabant Medicos, existimantes oportere, neque principiū præhensionis sensibile esse hecticæ febris, neque incrementum, neque vigorem, tanquam minimè contingat hecticam febrem putridæ alicui posse implicari: sed nobis statim primis dieb⁹ in hac muliere cognita est. Vtraque enim *†*accessio quæ *†*in iunctione *maxima.* die ac nocte fiebat, breues efficiebat partes accessions, ac sæpè cum madore quodā, aut perspiratione vaporosa soluebatur tam per-

spicue, vt corpus ipsum benè temperatū tangentibus sentiretur. Indicia autem in arteriis paulò antè dicta semper extiterunt, nequaquam refrigeratis ipsis similiter aliis partibus, neque velocitatem aut frequentiam motus amittentibus. Quæ ergo alio loco sæpe numero docuimus, etiam nunc dicimus: nō oportere solum circuitiones, atque proportionales accessiones considerare, sed multò prius ipsam speciem febris: ex eaque cognoscere ipsam febrem, quemadmodum ipsum hominem ex propria forma. Sic ipsi sæpe prima die ad hūc modū speciem febris cognouimus, minimè expectantes tertianā, aut quartanā, aut quotidianā circuitionē. Sed de his secundo libro de iudiciis latius docuimus, atq; eo ipso libro nihilominus diximus quō oporteat diariæ febris cognoscere differentias. Promiserā autem (scio) me dicturū hoc loco de illis. Sed cū recorderer pauca in eo libro desiderari, quo in plenū de omnibus præceptū esset alia quidē huc trāscribere superuacuum duxi, adiiciam verò ea tantūmodo quæ intra modum sunt in eo prodita.

Quibus indicijs febres diariæ à seinuicem discerpent: quoniā interdum propter æstum, quandoque ex frigore ipso febris diaria consistit.

Febriticantibus igitur propter æstum, *Ephemere*
 cutis magis ad habitum calidioreni & *propter*
 squalidiorē, quàm pulsus ad febrilem dispo- *æstū nota.*
 sitionem: mutatur quocirca sitis minus hos *Sitis.*
 infestat, quàm ubi æqualem habent calidi- *Epheme -*
 tatem. Ac primo occurso manus, calor in *repropter*
 ipsis vigere videtur, contrā quàm in ægro- *adstrictio*
 tantibus propter adstrictionem, in his enim *nem nota.*
 increscit. Caput præterea peruri maximè vi-
 detur, iis qui propter æstum febricitāt. Gau-
 dentque magis, & iuuantur frigidis fomen-
 tis, atque ipsorum oculi calidiores, & rubi-
 cundiores, videtur, cum siccitate, antequàm
 sine grauedine & defluxione febricitant. *Grauedo*
 Quibusdam enim propter æstum talia acci- *in febre et*
 dunt, caputque ipsis redditur non solum ca- *defluxio.*
 lidum, sed etiam plenum sanguine: ita ut
 omnes venæ admodum contenduntur, quæ
 circa oculos, & tempora, & frontem, & fa-
 ciem totam habentur. Quod autem pleni
 sunt non minimum indicium est, unde di-
 scernantur ab iis, qui ex humorum refrige-
 rio febricitant. Hi enim ubi caput malè af-
 ficitur, promptè præhenduntur grauedine, *Capitis*
 & defluxiones & febris ipsa interdum sym- *grauedo*
 ptoma est solius in capite dispositionis. Sed *ob æstum*
 magna ex parte tunc magis febricitant, quū *frequens.*
 corpus totum refrigeratum est, vel exstū.
 At verò cutis minus calida refrigeratis, atq;

intumore maiori corpus existit, nec quif-
quàm squalor circa faciem, qualis propter
æstum febricitantibus euenit sine capitis re-
pletionē. Sed magna ex parte caput solet ta-
libus repleri ab æstu, nisi quis fuerit admo-
dum purus, ac sine excrementis: iis enim tan-
tummodo contingit calefcens caput sine re-
pletionē permanere. Veruntamē interdum
sine repletionē multus calor præhendit
ipsum totum exustum. Hæc igitur affectio
perspicuè dissidet ab ea, quam frigus excita-
uit. Atquæ cum repletionē est, difficilè di-
stinguitur: vtpotè defluxionem inferens, ac
grauedinem, quæ etiam refrigeratis accidit
sed (vt diximus) squalor & magnus calor cu-
tis, & quæcunque alia paulò antè dixi, pro-
pria vstorum existunt: de quibus in plenum
libro de curandi via & ratione dicetur, cum
aliis omnibus diariæ febris differentiis: qua-
rum dignotiones quia secundo libro de iu-
diciis perstrinximus, non etiam hoc loco di-
cendæ sunt: sed hunc quidem librum hîc fi-
niemus, deinceps verò februm ex hu-
moribus accensarum omnes
differentias indica-
bimus.

PRIMI LIBRI FINIS.

CL. GAL. PERGA-
MENI DE DIFFE-
RENTIIS FEBRIVM,
LIBER SECVNDVS,

INTERPRETE LAVREN-
TIO LAVRENTIANO
FLORENTINO.

De differentijs febrü ex humorum putredine
infestantiũ: ubi refellit opinionẽ ponẽtiũ omnẽ fe-
brẽ putridã fieri ex abũdantia bilis. CAP. I.



EQVITVR vt de differen-
tia febrü ex humorũ putre- *Nõ omnis*
dine infestantiũ differamus: *biliosus*
id priũs de eis admonentes, *morbis est*
minimẽ sufficere (vt quidam *febris.*

voluerũt) ad generationẽ febrü augeri at-
que exuperare humorẽ biliosum, quem alij
pallidã, nõnulli flauã nominant bilem. O- *Arquati.*
mnes enim arquati maximã sic afficerentur
febre, quibus copia talis bilis in toto corpore
cõtinetur: sed hæudquaquã febricitãt priũs,
quã alia quẽdã causa cõcurrat, de qua pau-
lò pòst agetur. At verò absurdũ est in quar- *Quarta-*
tana, & quotidiana febre exquisita colligi *na febris.*
amarã bilẽ existimare, quẽadmodũ in ter-
tiana atq; causo. Etenim cõtra quã in illis

in quotidiana, & quartana febre, neq; vomitus biliosus, neque sudor, neque vrina, neque deiectiones videntur biliosæ: præterea nec quicquàm aliud quod præcessit, aut simul adest eis, subscribit. Febris enim tertiana parte plurima cōsistit in corpore naturâ bilioso, & in etate vigoris, quæ est omnium ætatum maxime biliosa, & æstiuo tempore maxime quo talis humor exuperat. Idem in regione calida & sicca temperamento & cōditione ambientis aeris tali, & vita non otiosa, ac desidii plurimum, sed in labore, cura, vigiliis, æstu, & victu parco, eoque calido & sicco. Quin & immoderatus usus medicamento- rum calefacientium & exiccantium cōmittit febrem tertianam. Quotidiana verò ecōtrario penitus efficitur in naturâ pituitosiore, ac tempore hyberno, & cōditione frigida & humida, senibus & pueris potius, in regione frigida & humida, & vita otiosa simul cum repletionem, maximeque quoties post cibum lauitur: ac multò magis, ubi ipse cibus pituitosior naturâ existit. Sed neque vomunt tales biliosum humorem, neque deiciunt, neque sudant, quemadmodum in tertiana febre. Hæc enim ex flava bile putrescente fieri solet: quotidiana verò pituitosum humorem subsequitur, quomodo quartana melancholicum. Sic namque natura corporis magis melancholica,

&

& ætas inclinans, & autūni tempus, necnō o-
 mnia his proportionalia in cibo potuq̃ue, &
 toto victu, frigida & sicca temperamento,
 febrē gignūt quartanā. Et ob eam rē præce-
 dens eas rigor nequaquā similis est: sed in
 tertiana quasi pungens ac vulnerās sensum,
 efficiētē causam indicat: in quartana autē
 quasi refrigerās. Sed de forma rigoris libro
 de causis symptomatū diffinitū abūdē iam
 est, vbi etiā de eiusdem generis febriū diffe-
 rentia est proditū: nempe ex eis intermitten-
 tes (ita appello eas, quæ ad integritatem sen-
 sibilem desinūt) ex humore moto ac in o-
 mnem corporis partem delato efficiente fe-
 brem cōsistere: synochos verō ex condito
 & contento in venis, de quarum cognitione
 secundo libro de iudiciis docuimus.

*Februm intermittentium tres haberi diffe-
 rentias: quotidianam, tertianā, & quartanam,
 atque esse synochon, id est, continuam, quam fla-
 ua bilis committat.*

CAP. II.

Febrium igitur intermittentiū omnes
 differentiæ tres existunt quotidiana, tertiana,
 & quartana, ex pituita putri: quoti-
 diana: ex vtrāque bile, flava quidem, ter-
 tiana: atra autem, quartana efficitur. Conti-
 nuarum verō quæ ex flava bile consistūt du-
 plex genus est: vnū quidem earū quæ syno-

*Febrū in-
 termitten-
 tiū & con-
 tinuariū di-
 scrimen.*

Continua chi, id est, continentes appellantur, quarum
ex flaua omne tempus vna accessio est ab initio vsq;
bile du- ad finem: Alterum, earum quæ cōmuni sed
plex syno- ambiguo genere continuæ dicuntur, & mul-
cha & con- tis particularibus circuitionibus continen-
tinua. tur. Cæterum synochæ differentia omni-
Cōtinua - nò tres existunt. Quædam enim earum ab
rū febrū initio vsque ad finem æqualis persistit, quæ
differen- dā paulatim crescit, quæ dā paulatim decre-
tia. scit. Ac nonnulli primā nominant homoto-
Homoto - nū, & æmasticā, id est, æqualiter affligentē
nos. ac vigentem: alteram anabaticā & epacma-
Epacma - sticam, id est, ascendentem atque increscen-
stica. tem: tertiam verò paracmasticam, id est, in-
Paratma clinantē appellant. Synechæ porrò duæ
stica. differentia primæ existūt. Nam aliæ tertio
 quoq; die tantummodò habent accessionē,
 aliæ die intermedio alteram inferunt acces-
 sionem. Atque hæ nullum nomen peculiare
 obtinent. Febrem autem tertio quoque die
Tertiana accedentem, ego quidem nomino tertianæ
cōtinua fi finitimam: non tamē prohibeo, si libeat, ali-
nitima. ter appellare, inodò serues in rebus ipsis dif-
 ferentiam. Alia enim est natura, quoties de-
 sinunt ad integritatem, alia quoties ad incli-
 nationē febrilem finiūtur, febres continuæ
 alternis diebus accessionem habētes. Et ad
 hæc vbi in medio altera fuerit accessio, na-
 tura quædam diuersa est: sed nullam ex his
 sem

semitertianam appello, nō tamen prohibeo *Semiter-*
 ita nominare volentes, si id vñū mihi cauea *tiana.*
 tur ab eis, vt nullum febris genus omittatur,
 sed vnuin quodque deinceps dicatur quem-
 admodū ergo nūc in hoc libro facere insti-
 tuti. Ex cōtinuis enim quæ in die medio ac-
 cediūt, quēdā in forma quotidianę procedit,
 duas accessiones simillimas inuicē efficiens:
 quædam verò diſsimiles habens duas acces- *Continua*
 siones primæ quidē tertiā simillimā obti- *in forma*
 net, secundæ verò quartā, in forma duarum *quotidia-*
 tertianarū procedēs: sed hæc ex bile potius: *ne habens*
 illa singulis diebus similiter accedens, ex pi- *accessione*
 tuitoso humore cōsistit. Porro tertiū aliud *mediam.*
 genus est febriū continuarū rarō eueniens, *Continua*
 quoties accessio in forma quartanę circuitio *in forma*
 nis procedit, nequaquā desinens ad integri *tertianę.*
 tatem. Accidit autem, quemadmodū febris
 tertio quoque die accedens, interdū duplex
 ac triplex: ita etiam hæc nō solū duplex, sed
 etiam triplex. Sed hi febriū implexus libro
 de typis cōmodius indicantur. Febrium au- *Trium fe-*
 tem simplicium ex humoribus intestantium *brum im-*
 † simplices differentię tot numero sunt, *plexas.*
 quot proximē docuimus. Ex earum autem *† σίμπλω*
 permixtione aliæ quædam efficiuntur, de *σιν.*
 quibus deinceps dicam, si prius de simplici-
 bus quod deest, adiecerō: vt quæcunque fue-
 rit omnino simplex febris, vnam speciem
 quasi

Febres sim quasi regulam quandam obtineat earum,
plices com quas proximè indicabimus. Quæcunque ve
positarum rò degenerat aliquatenus, eatenus ab ipsis fe
sunt regu- bribus simplicibus abscedit.
la.

Quonam modo ex flaua bile delata in uni-
Febris ex uersum corpus rigor existat: & ut ipsius tertia-
flaua bile na accessio, quod longissimum sit, horarum duode-
indicium. cim occupet.

CAP. III.

Hora æ- **F**ebri igitur excitata ex flaua bile dela
quinoctia ta per corpora sentiētia, præhendit cū
lis. 15. gra rigore, atque causodes est: & vomitu bilis,
dibus defi- vel deiectione, vel sudore, vel quibusdam
gnatur ut horum, vel omnibus simul soluitur. Huius
distinguat febris longitudo accessionis quæ maxima
ab inæqua sit, horarum est æquinoctialiū duodecim:
libus & atque appellamus eam exquisitam tertianā,
planeta- ex temperamento ægri bilioso, ac tempore,
rijs solsti- & regione, & conditione, & victu calido &
tialibus æ- sicco effectam. Sed omnia alia paulò antè
stiuus bru- docuimus, quæcunq; cōducunt ad eius gene
malibus rationem. Atq; accessio breuior est magna
seu hyber- ex parte, quàm quæ antea dicta est longitu
nis. do, perquam multā maioris ac minoris obti
Accessio - nens differentiam: vel propter quantitatem
num ter- & qualitatem ipsius bilis, vel propter ægri
tianæ dif- vires, vel propter præsentem tunc in ægro
ferentiæ. corpore dispositionē. Bilis enim copiosior,
 longiorem quàm paucior efficit accessionē:

ten

tenuis, breuiorem quàm crassa. Sic *verò* & vires validiores, breuiorem: imbecilliores, longiorem. Et corporis dispositio rara quidem, breuiorem: densa verò longiorem. At verò tempus intermissionis in tali febre, ex pulsu indicium putredinis humoris penitus obscurum habet, sequenti die ac nocte post accessionem. Leuiter autem succensa aegrè cognosci potest primis partibus posterioris diei: sed adhuc clarius circa fines eiusdem diei aut noctis: atque adhuc clarius proxima die vel nocte, quæ præcedit scilicet diem aut noctem accessionis. Sanè in ea ipsa perspicuum iam est indicium: multoq; magis, quoties accessio præhendat: ac multò magis, vbi ascendat ad ipsum consistendi vigorem. In eo verò minus quàm per incrementum, rursusq; multò minùs per inclinationem. Hanc febrem si libeat nominare exquisitā tertianam, nomine vteris antiquo: sin minùs at certè nobis dabis ita nominare gratiā perspicuitatis doctrinæ.

*Intermissio-
nis tem-
pus.
† ἀδιδύω
son.*

*† Vide, nū
magis sit
legendum.*

Pituitam refrigerare partes extremas per initia accessionum, difficulterq; accendi calorem minimè purum, sed similem fumo quasi uiridioribus accensis lignis.

CAP. II II.

ALIA porrò est simplex ac exquisita febris ex pituita putri, quæ per membra sent

*Pituitosa
simplex.*

sententiâ pellitur ab ipsa naturâ, consistēs:

*Initium pi-
tuitosæ sim-
plicis.*

Ea incipit ex frigore partium extremarum atque horrore potius, quàm rigore: difficulter accenditur, longuinq; obtinet incrementum ad ipsum consistendi vigorem: quoniâ humor ipse ex quo consistit, frigidus atque humidus est temperamento, ac glutinosus cōsistentiâ. Itaq; difficulter accēditur, ac tardè mouetur sæpè in ipsis meatibus hærens. Ac premit quidem interdū, grauatq; vires.

Pulsus.

*Biliosæ &
pituitosæ
discrimen
inter ini-
tia.*

Inæqualem autem ac magis debilem efficit paruumq; pulsum in principio ac primo incremento. Per febrem verò biliosam existit inter initia accessionum vnaquæq; affectio ex dictis circa pulsum: sed ab illa quidē citò abeunt, tum alia, tum etiam inæqualitas, quæ magna ex parte nec cum talibus febribus accedit, nec tales febres comitatur.

Analogia.

Calor autem ipse non multò postquàm destitit rigor, accenditur luculentus, quemadmodum ignis quidā planè purus, in quo nul-

*Accessiopi-
tuitosæ.*

la fumosa caligo inuehitur. Calorem verò pituitosi humoris assimilabis igni fumoso lignorū viridiū accensorum. Euacuationes igitur in eo paucae existunt, ac lōgitudō accessionis diuturnior: & tēpus intermissionis non æquè ac primū purum est, sed semper seruans in calore & pulsu, putredinis humoris indicium. At verò & in hac febre cir-

ca principia, atque incrementa accessionum indicium putredinis est manifestissimū. At tamen & hæc ubi exquisita fuerit, videtur multis habere puram intermissionē: & nos ipsi ita etiam non rarò dicimus, quoties im-
 portuna sermonis curiositas videtur. Accidit autē naturæ corporis, tēpori, regioni, tempe-
 stati, studio, victui, & aliis omnibus pituito-
 sis. Accedit verò singulis diebus, quanvis mi-
 nūs calida sit quàm biliosa, quæ tertio quo-
 que die fatigat. Sed cōstat hāc quidē (quo-
 niam & humorē habet accēsu facilē, & prō-
 ptē semper ob tenuitatē quicquid eius ferue-
 factū est per accessionē, expurgatur) ad in-
 tēgritatem quandam magis purā desinere,
 & exiguum post accessionem vestigium pu-
 tridi caloris relinquere: eam verò quæ ex pi-
 tuita consistit, nec integrè purgari per incli-
 nationes accessionū, nec exiguum, quod ve-
 lut succendatur, relinquere. Inde ergo effici-
 tur & intermissio multò deterior, & secun-
 dæ accessionis maturius principium.

*Intermis-
sio pituito-
sa.*

*Humor in-
cēssioni pro-
pensus.*

*Accessio-
nis ad inte-
gritatem
desinentis
causa.*

*Intermis-
sio dete-
rior.*

De quartana quæ ex atra bile consistit: & quonam modo fieri possit, ut rigor sine febre efficiatur.

C A P. V.

*Quarta-
na exqui-
sita causa
& inter-
missio.*

AC verò tertium genus intermittentiū febrium, quartana scilicet exquisita, quoties ex humore melācholico solo effici-
 tur

tur frigido siccoque temperie, paulatim quidem succenditur: quemadmodum lapis quidam, vel testa, vel os, vel aliud quodpiā sic frigidum & siccum corpus. Vbi verò flamma quædam ex eo accensa est, nihil relinquit fumosum, neque semiustum post accessionem: & ob eam rem euacuationes plures ex tali humore quā pituitoso, & intermissio planè pura esse videtur, eò quòd hīc omne id humoris melancholici quod est accensum euacuatur atque discutitur. Et ob

*Quarta -
narum ri-
gor.*

eam rem accidit illis rigor qualis potissimum in forti frigore refrigeratis: non qualis interdum existit: per æstum vel lassitudinem, vel medicamentum calidum, ac mordax vlceri adhibitum. Cæterum necesse est hanc febrem antecessisse quicquid colligit

*Quarta -
ne obno-
xij.*

atram bilem, ex vitæ genere, victu, cœli statu, tempore, regione, natura & ætate ægri melancholica. Accessio præterea huius febris longitudine temporis, tertianæ similis est: atque interdum accidit, vt sit longior, quā

*Quarta -
ne acces-
sio.*

uis exquisita sit, quoniam ex humore frigidore consistit. Causa autem similis est in his febribus & aliis omnibus quæ differen-

*In acces-
sione lōgi-
tudinis cau-
sa.*

tiam longitudinis efficit accessionum, quæadmodum paulò antè diximus in exquisita tertiana: in multitudine & qualitate humoris, & robore & infirmitate virium, & ad

hæc

hæc ipsa ægri dispositione differentiam habente. Nam & alia omnia proportionē respondent iis quæ ex humore bilioso consistunt. Quocirca si humor melancholicus neque putrescat, neque vehementer feratur per corpora sentientia, nequaquam efficit melancholicam circuitiōnem exquisitam. Sanè arquatis affectibus proportionē respondent ex liene morbi diutini melancholici, corporisque totius colores fœdi. Et erysipelatibus ac herpetibus qui ex flaua bile consistunt, cancri & phagedænæ proportionē respondent. Sed neque ex his neque ex melancholicis affectibus necessariò febricitant, nisi prius humor melancholicus & biliosus putrescant. Natura enim semper nititur, suis viribus vtens, assimilare partibus nutritiōdis quicquid fieri vtile potest: excernere autem id quod minimè istiusmodi est. Quòd si interdum præ crassitie, vel copia, vel lentore excrementi, vel stipatione quadā meatuū, vel sua ipsius debilitate nequaquam possit excernere humorem vniuersum prauum, immorātem diutiùs in ipso corpore animalis putrescere necesse est. Nullus enim alius humor permanere qualis extitit ab initio, potest, nedùm qui adeò vitiosus est vt ab ipsa natura cultū amplius suscipere nō possit: sed aut cōcoctus apponitur atque

*Arquati
atrabilia-
res.*

*Serpētia.
Ignis sa-
cer.*

*Comesa.
Modus pu-
tresfactio-
nis.*

assimilatur solidis animalis partibus, aut cor
Arquatis rumpitur atque putrescit. Ad hunc modum
superuenit arquatis ac melancholicis affectibus, quoties
febris. humor biliosus exuperans in corpore diu-
 tius immoratur, febris superuenit. Sepè etiā
 dispositio in iecore & in splene attulit fe-
 brē, quoties aut inflammatio aliqua, aut ob-
 structio committit prædictos affectus. Pari-
 ratione nec ubi pituitosus humor exuperat,
 febris sequitur, nisi putrescat prius. Atq; ob
 hunc quidem, quod ab antiquis existimatū
 est esse impossibile, sæpenuerò visum est:
Rigoris id autem est sine febre rigor, qui nonnullis
circuitus. quidem semel accidit, nonnullis autē etiam
 per circuitum pluribus diebus, vel continuus
 ab initio vsq; ad finem, vel omnino ita me-
 diocris, vt nequāquā esse videatur, quo-
 ties quieuerint, sed ubi moueātur tātūmo-
 do efficiat sensum: vel etiā maior, vt etiā si-
 ne motu infestet. Sed quoties talis humor
Febris solu- spacio temporis putrescat, nō rigent solū:
tu diffici- sed etiā febricitant. Et diuturna admodū
lis. & solutu difficilis febris in quotidianæ for-
 ma tales affectus sequitur.

De febre epiala qua simul febricitant ac ri-
 gent, ac de humore quem Praxagoras uitreum
 appellauit, & quoniam pituitæ genera sint.

Hoc genere continetur febris epiala propriè nominata, quoties simul febricitant ac rigent: & utrūque sentiunt, eodem tempore in quavis corporis parte. Sanè Archigenes existimat de nulla altera nomen epialon dici, quàm de vna hac febre. Sed cōstat Atticos quosdam viros rigorem ante febrē ita appellare. Enimuerò Praxagoras videtur mihi appellare vitreum, humorem talem. Recentiores autem, è quibus Philippus est, crudum simpliciter, nullum adicientes vocabulum ad exquisitam definitionem. Is profectò ex specie pituitosi humoris est: ut qui admodum frigidus atque humidus sit. Quisquis enim humor frigidus simul & humidus fuerit, sub ipsam phlegmatis, id est, pituitæ cadit appellationem, si quis Hippocraticè & ex omniū cōsuetudine non solum veterū, sed etiam aliorum scriptorum nominare voluerit. Prodicus enim libro de natura hominis prauè nominat, errans circa tale vocabulum ipsa demiranda etymologiā adductus. Sed nō est præsentis temporis ad talia deflectere orationem, cū aliā dicarimus illis disputationē. Ergo rursus ad Institutū veniamus. Quisquis in corpore humor fuerit frigidus & humidus, ipsi hūc nominamus pituitā: tu si libet appellabis scindapsum. Ad cō sanè nulla mihi vocabu-

*Epiale
causa.*

*φριξέος
i. lentus.*

*Pituita
quid.*

lorum est cura. At verò scias huius humoris
 plures esse differentias. Nam vna quidē spe-
 cies eius est admodum frigida: ita ut maxi-
 mos dolores adferat, quum in locum calidū
 impacta est. Et sæpenumerò multos dolo-
 res eorum qui colici dicuntur, ex acri clyf-
 mate tali humore euacuato, statim sedatos
 intueri licet. Hic autē humor videatur simi-
 lis aspectu vitro fuso. Altera verò species pi-
 tuitæ est, quā excreantes sæpè expuunt qui-
 dam sensibilem obtinēs dulcedinem. Con-
 statque eam nequaquam posse esse omninò
 frigidā, si recordamur eorū quę libro de sim-
 plicium medicamentorū viribus docuimus.
 Tertiapræterea species alia pituitæ est, quæ
 ipsis expuentibus acidā sentitur, ac minùs
 quàm vitrea, magis quàm dulcis frigida est,
 quēadmodum altera salsa habetur, aut ob
 putrefactionē, aut ob permixtionē salsæ se-
 rosæ humiditatis: ex qua febricitātes mini-
 mē rigēt, sed horrēt tantūmodò, præhédēte
 accessione. Acida autē ac vitrea si mouea-
 tur, per corpora sentientia permeans, infert
 rigore sine febre. Quòd si qua putredo mo-
 derata illis adfuerit, epialā cōmittit febrem.
 Sin magis putrescat, rigor præuenit: febris
 ipsa subsequitur, deuictō frigore ab ipsa
 multitudine caliditatis, ita ut nullo modo
 existat per incrementa & vigores accessio-

*Pituitæ
species.*

*Phlegma
uitreum.*

*Phlegma
dulce.*

*Phlegma
acidum.*

*Phlegma
salsum.*

*Rigor sine
febre.*

*Febris e-
piala.*

nū. At verò vitrea pituita forsitā acidę qua-
 litatis particeps est: ita vt omnes eius differē-
 tię tres existāt: acida, dulcis, falsa, atq; ex pi-
 tuita dulci putrescēte rigor minimē antece-
 dit febrē, forsitā verò neq; simpliciter, neq;
 à simplici causa quis existimarit tales fieri fe-
 bres. Siquidem quicquid pituitę putrescit,
 ac tendit febrem reliquum nondum putre-
 scens, ex quo rigent non eiusdem est qualita-
 tis, cū ea quę putrescit. Si igitur ab hac qui-
 dem rigor, à putrefacta verò febris efficitur,
 duplex semper causa erit. Licet verò hīc di-
 cere febrē ab altero quidē fieri causę gene-
 re, rigore autē ab alio: vt qui nō sit, quod
 febris. Per febrem tamē tertianam flaua bi-
 lis & rigorem efficit, & febrē. Sed hęc logi-
 cę magis sunt cōsiderationis: nos ad institu-
 tum nostrū redeamus. Permixta pituita pu-
 trescente, ex qua fieri quotidianā docuimus,
 cū bilioso humore efficiēte tertianam, com-
 posita duplex quę causa & dispositio fuerit.
 Alter enim humor vno quoq; die, alter ter-
 tio quoque die cōmittit accessionem: ita vt
 vnus dies duas habeat accessiones: alter verò
 vnam, quā tempore accessionis in easdem
 horas minimē incidūt. Vbi enim incidant,
 vna erit cōfusa, neq; tertianę, neque quoti-
 dianę exactam speciē seruans. Et quoniam
 vtraque febris duplex est, implexus quatuor

Pituita vi-
trea.

Pituitę
tres diffe-
rentię.

Rigor ex
pituita
dulci.

Rigoris in
febre ter-
tiana cau-
sa.

Tertianā
quotidia-
nā imple-
xa.

Hic initiū
aliū faciūt
7. cap.

Tertianā
quotidia-
nā cōfusa.

Febris ter-
tiana &
quotidia-
nā duplex.

Tertiana erunt. Vnus, in quo tertiana permiscetur
et quoti- quotidiana: secundus, in quo tertiana permi-
dianae im- scetur continua quotidiana: tertius, in quo
plexus permiscetur quotidiana tertianae continuæ:
quatuor. quartus autem, in quo permiscetur quotidia-
 na continua tertianae continuæ.

Accessiones Quot modis fieri conveniat implexus febrium,
implexa- ex quibus ager minimè deducitur ad integra-
rum febrium tem.

CAP. VII.

cōcurren- CAETERVM vnus cuiusq; dictorum im-
tes. plexuum differentia duplex est. Inter-

Non con- dum enim omnes accessiones eodem tem-
currentes. pore simul inuadunt, quandoque diuersis tē-

Accessionis poribus accessiones præhendunt. Sed hi co-
species. gnosci facile possunt, præterquàm quòd sæ-

Accessionis pè intermittens minimè cognoscitur à pa-
tertianae rùm exercitatis: quoniam ægri nūquàm de-
nota. ducuntur ad integritatem, sed oportet spe-

Hic hora ciem considerare accessionis, quemadmo-
distingui- dum secundo libro de iudicio satis dictum

tur initio iam est. & inde cognoscere, non ex ipsa cir-
diei factio cuituum proportionem. Subiiciatur enim ve-

hora sexta nisse cuiuspiam circa horam primam, accessionem si-
matutina. mul cum rigore, qui videatur vulnerare car-

nem laborantis, deinde omnia alia tertianæ
 febris indicia usque ad vigorem processisse:
 cum vomitu bilis simul cum sudore benigno
 inclinare, atque esse iam diei horam nonam.

Po

Porro cōiectare nos ex toto accessioneis mo-
 tu, circa vndecimam horam sine febre fore
 ægrotum, ea scilicet integritate quam in cir-
 cuitibus nominare solemus. Ita verò speran-
 tibus statim subsistere sudorem, aut densata
 solūm, aut etiam inhorrescēte cute. Deinde
 initium, atq; incrementum, & adhuc vigo-
 rem in genere continuę febris pituitosę se-
 qui: duplicē profectò ita cognoscemus cau-
 sam esse ac speciem febrīū, mixta intermit-
 tente cum continua, quamvis nulla inuenia-
 tur intermissio. Ac sequenti quidē die spera-
 mus præhensuram accessioneis hora nona,
 & si vt expectabamus res ipsa eueniat, peni-
 tus tertio die similiter sperabimus adhuc fe-
 bricitante ægroto, iterū præhensuram eum
 tertianę febris accessioneis hora prima.
 Quòd si præueniat, aut cunctetur accessio,
 quā secūda die sperabamus fore hora nona,
 atq; ea quā tertio die credebamus futurā pri-
 ma hora: non etiā posthac sequentibus die-
 bus, neq; nonam horam, neque primā expe-
 ctabimus, sed tantò prius aut posteriùs, quā-
 tò proportio primę circuitiois accessio-
 nem præuenisse ab hora qua initio cepit, aut
 tardasse, indicauit. Vtra verò earum desitu-
 ra sit prius, tūm ex febris specie cōiectan-
 dum est, tūm ex ipsa accessioneis longitudi-
 ne, & magnitudine, & more, & motu, & itē cat.

*Accessio
pituitosę*

continua.

*Tertianæ
intermit-*

tentis cum

cōtinua pi-

tuitosa no-

ta.

Præsigni-

ficandi modus.

Species fe-

bris desinē-

tem indi-

Lege com circuituū repetitiōe, & anticipatione & tar-
men . aph. datione, & adhæc indiciis quæ postea appa-
12. lib. 1. rent cruditatis & cōcoctionis totius morbi,
Accessiōis quorū in vrina maxima cēsantur. Ac de his
accidētia . omnibus libro de iudiciis satis dictum est.
Circuituū Quod si pituitosa continua nequaquā ad
ratio . nonam horam, sed quintam aut sextā exci-
Vrina eff piat intermittentē biliosam, quæ prima ho-
cruditatis ra incepit, adhuc difficilior cognitu est vul-
concoctio- go isti medicorū, quibus talis consideratio
nisq; potis minimè curæ est, an scilicet sit vnū febrium
simū indi- gen^o quod infestat, an duo, & quod nā vtrū-
cium . que sit. Ceterū tāquā nihil horū cogno-
Pituitosa scentes, non solū nesciunt quonam modō
continua oporteat curare eas quæ nequaquā cogno-
simplex et scuntur quales nā sint, sed neque vtrū secun-
permista . da die suspectas habere conueniat vtrasque
 horas, quæ prima die accessiones attulerūt.
 Ego nāque (scio) visus sum eis sæpenuerō
 vaticinando potius quā præsentiendo, vt
 medici solent coniecisse initiū accessionis.

*Permisceri inuicem febres, scilicet tertianam
 exquisitam & quotidianam: & quonam modo
 Agabinius errauerit circa semitertianam.*

CAP. VIII.

**Feb. quoti-
 diana.**

PER hanc igitur mixtionē (de qua nunc
 agimus) tertianæ cum ea quæ quotidie
 accedit, vidi interdum circa primam horam
 præh

præhendere accessiōē exquisitæ tertianæ,
 circa sextam autē existere accessiōē eius,
 quam recentiores medici propriè nomināt
 καθημερινή, id est, quotidianam. Solēt enim
 ita nominare febrē quæ singulis diebus ac-
 cedit, nequaquā desinens ad integritatem.
 Ipse verò solitus sum talē nominare ἀμφι-
 μερινή συνεχῆ, id est, quotidianam cōtinuā,
 nomē enim καθημερινή, nequaquā licet in-
 uenire apud quenquam Græcorū scriptum,
 sed ἀμφιμερινή appellant, rem omnem quæ
 singulis diebus similiter fit, sed vt Plato di-
 xit, contemnere oportet nomina eos quibus
 tantarum ac talium rerum proposita est con-
 sideratio. Appelletur igitur, gratiā clarioris
 doctrinæ, ea quæ singulis diebus accedens
 desinit ad integritatē, quotidiana simplici-
 ter, nihil insuper addēdo ei per orationē: ea
 verò quæ minimè desinit, quotidiana cōti-
 nua: ac liceat tibi, si libeat, alteri adiicere,
 intermittēs. Pari ratiōe dicēdū, & de ea quæ
 tertio quoq; die accedit. Altera enim diffe-
 rentia tertiana simpliciter, vel etiā intermit-
 tens tertiana habetur, altera tertiana conti-
 nua est. Licet verò & continuam tertianam
 nominare tertianam simpliciter, sine adie-
 ctione vlla: quemadmodum nonnulli appel-
 lant. Sed enim non opus est fusiùs disputa-
 re de nominibus: sed redire ad institutum.

καθημερι-
νός.

Quotidia-
na conti-
nua.

ἀμφιμερι-
νός.

Simplici-
ter quoti-
diana

quid.
Quotidia-
na conti-
nua.

Tertiana
simplici-
ter, uel ter-
tiana in-
termittēs.

Tertianæ
cum quoti-
diana im-
plexæ hi-
storia.

† τε καὶ
 πολλὰ,
 ὅ multi
 καὶ γὰρ
 τριῶν δια-
 χύσεων
 πικρὰ καὶ
 πικρὰ
 χολὰ καὶ
 ὅτι
 τριῶν excre-
 tionem bi-
 liosam sa-
 tis multā
 in quibus-
 dam codi-
 cibus.
 † συνέ-
 λη, supra
 dixit de sa-
 ta est cu-
 tis.
 † ἀκριβὲς.
 i. germa-
 num ac ue-
 rum.

Nam adolescens in quo dixi implexum ex-
 titisse tertianæ cum quotidiana continua,
 prima quidem die mane incepit cum rigore
 tertianæ proprio febris, alia omnia seruans
 exquisitæ tertianæ indicia usque ad sextam
 horam, subitumque vomitum biliosum, et ac-
 paruum sudorem, à quo statim et contractus
 est atque inhorruit homo: deinde rursus præ-
 hendentē accessione, pulsus erat parvus &
 inæqualis: post usque ad horam undecimā,
 successa adhuc paulatim, pleraque ipsius ac-
 cessionis habebat propria: pauca verò quæ-
 piam ipsius quoque incrementi: deinde us-
 que ad noctis horam quartam incrementum
 et diligens erat, post in eadem magnitudine
 permanebat ad ipsum quidem senium, usque
 ad horam noctis sextam. Vnde iam perspi-
 cuè videbatur inclinare usque ad quartam
 horam in secundo diē. In ea enim contrabe-
 batur, atque ipsius accessionis indicia osten-
 debantur, partibus quidem ipsius extremis
 frigidioribus euadentibus, pulsu autem par-
 uo: atque crescebat usque ad vespertinam pau-
 latim, neque horrorem quempiam, nec inæ-
 qualitatem aliam efficiens: deinde rursus vi-
 gebat circa horam quartam noctis, ac sensi-
 biliter inclinare incipiebat circa sextam. Ac
 quod quidem tertia die hora circiter secun-
 da oportebat eius expectare accessionem
 fore

fore quotidianam, perspicuum erat: non tam tertiana, an seruatura esset eandem horam, an non, perspicuum erat. Accessio igitur horrida incepit hora secunda, quæ citius quàm pro accessione, in prima ac secunda die continuæ quotidianæ increscens usque ad quintam horam, initium rursus alterum fecit post quintam horam, atq; ei erant omnia symptomata similia iis quæ secunda die extiterant. Deinde rursus increscens promptius usque ad octauam horam, rursus horruit in illa hora, ac paulò post accessio promptè ascendebat increscens: ita vt circa horam noctis quartam ad consistendi vigorem deduceretur. Ecquidnam aliud quàm exquisitæ semitertianæ hæc accessio extitit? Cum duæ febres eadem hora inciperent, eò quòd quæ singulis diebus repetebat, duabus horis præuenisset: tertiana verò duabus horis tardasset. Quocirca nitenti dignoscere speciem febris perspicuè, videri potuissent téperata ac permixta tertianæ, ac continuæ quotidianæ symptomata. Cum enim tertiana cum rigore incipiat, quotidianaverò sine rigore permixta ex vtrisque horrorem statim inferebat, rem quidem minorem rigore, maiorem verò frigore: ac tantò maiorem frigore, quātò minor rigore est. Quapropter æqualiter distans ab extremis vtrisque hor-

*Iniū ac-
cessionis si-
gnum.*

*Accessio
horrida.*

*Exquisita
semitertia
na.*

*Tertiana
cū rigore.*

*Quotidia
na cū fri-
gore.*

*Semiter-
tiana cum
horrore in-
cipit.*

Horror rīror in medio amborum collocatur, rigoris
 goris fri- scilicet atq; frigoris: id quod tēperatis inui-
 gorisq; me cem extremis potissimum fieri solet. Ergo
 dius. nō ab re nomē tali febrī semitertianā indi-
 Semiter- derūt. Tēperata enim ex quotidiana conti-
 tianæ de- nua actertiana intermittente, totius suæ na-
 nomina- turæ partem dimidiā utrāque prædictarum
 tio. febriū habet. Vt igitur hemionus, id est, mu-
 lus est ac semideus dictus: eodem modo se-
 mitertiana. Mulus enim medietatem quidē
 equi cōducentis ei ad generationē, medieta-
 tem verò asini habens, ab altero eorum tan-
 tummodò dictus est. Et semideus, indicatur
 quidē participare dei medietatem: quòd au-
 tem homo sit altera ex parte, omittitur. Iti-
 dē semitertiana, medietatē alterā habet ter-
 tianam, medietatem alterā quotidianā con-
 tinuā. Sed duplex modus generationis eius
 est, aut enim in vnū tempus duæ accessio-
 nes concurrūt, vt paulò antè dixi, quia alte-
 ra præuenit, altera cunctatur: aut ambæ sta-
 tim ab initio inuicem temperantur. Ac quæ
 quidem ambabus in vnum tempus coeunti-
 bus fit, vnā solam habet accessionem natu-
 ræ ipsius semitertianæ: altera verò, omnes
 ab initio morbi vsq; in finem, quæ maximè
 propriè semitertiana ab omnibus nomina-
 tur. Sed de hoc paulò pòst agetur, potissimū
 propter Agathinum & Archigenem. Adole-
 scen

scienti igitur quę nostra narratio supposuit,
tertio die tali veniente accessione, propterea
quodd in vnũ tempus ambarum febrium ac-
cessiones incidissent. præueniente duabus ho-
ris quotidianę ipsius accessione semper ter-
tiana autē cunctante semper duabus, acces-
sio quarta die incepit, oriente sole speciem
seruans exactā febris pituitosę. Futurũ au-
tem ex proportionē erat, vt quinta ab ea ac-
cessio inciperet circa decimam horā noctis,
quoniā semper præueniebat horis duabus
ab initio: tertia autē accessio febris biliosę
habitura principium erat quinta die, hora
quarta, ita vt mediũ interstitium initii dua-
rum accessionũ foret sex horarũ, quod etiā
factũ est, circa decimā horam quartę noctis
incipiente accessione secundũ speciem pituitosę
febris: atq; ita procedente vsque ad horam
quartā diei, coeunte verò cum biliosa simul
modico rigore, deinde rursus permixtā spe-
ciem habente accessione secundum biliosę
simul ac pituitosę speciem. At verò subse-
quenti nocte circa octauam horam pituito-
sa febris incipiens exquisita, ac sola totam
obtinuit sequentē diem, quę sexta fuit: tum
autē vsque ad mediā noctem inclinās, inde
rursus incepit eodē modo. Postea reliquam
noctis medietatem, & tēpus vsque ad meri-
diē septimę diei obtinēs, iam quodāmodo
incli

inclinavit. Sed tertiana ei successit cū rigore incipiēs, quemadmodū solet incipere exquisita tertiana: atq; alia omnia eodem modo exquisita afferens indicia, bilis vomitum effecit, & deiectionē biliosam, & urinā bonam, & quendā madorē crepusculo vespertino, indicās perspicuē iis qui didicerunt cognoscere genera febriū, quòd remitteretur, atque inclinaret, & solūda esset post vnā, vel (cū tardissimè) alteram circuitiōnem. Etenim inclinatio facilitatem habuit mirabilē quandā, & qualem nulla ex prioribus, vsque ad horā noctis quartam. In illa enim febris pituitosa singulis diebus accedens, horis autem duabus præueniens, incepit, atque occupans totā noctē, & totum sequētem diē, rursus incepit octaua nocte, secunda hora: quā quidem noctē totam occupans inclinavit sequenti die nono. Accessiō autem tertianæ erat futura in illa die circa octauā horam: quoniā duabus horis cunctabatur. Sed tunc circa horam nonā incepit, indicans adhuc eo suam inclinationem. Sole autē occidente coiuit cum ea accessiō pituitosa, anticipādo inuadens, quēadmodū solita erat, & noctē occupās illam, & sequentem diem, rursus incepit decimo die, hora decima. Dein rursus vndecima die hora octaua exactē permanēs pituitosa: deinde circa horā

noctis primā, initium horrificū tertianæ febris quatuor horis tardātis extitit, tum autē sexta hora noctis venter deiecit biliosa, & quidā in toto corpore sudor extitit : & post hæc tota inclinatio prope integritatē deuenit, atque erat iam perspicuū tertianam destitisse integrè, pituitosam autem esse relictam solam iam & inclinantem. Has igitur ob res circa duodecimam diem, nec insuper accessio præuenit horis duabus, quēadmodū antea solita erat : sed septima hora incepit, deinde circa decimam tertiā haudquaquam sexta : sed tardauit, ac septima hora incepit, ostēdens insignem facilitatem atq; inclinationem. Quartodecimo autē die inclinatio multò melior extitit, atq; accessio incepit hora nona, & in vrina insigne concoctionis indicium apparuit, prænūtiāns fore solutionem futuro decretorio, sed de hoc nūc non est sermo, nisi obiter. Quod autem sæpenu merò permisceantur diuersi generis febres medicorum vulgus latentes biliosæ scilicet pituitosis, itenique cōtinuæ intermittentibus, præscriptus ægrotus abundè indicauit.

De differentia semitertianæ.

CAPVT IX.

SEd quum de his satis dixerimus, ad id quod paulò antè promisimus, rursus venia

*Tertiana cū quoti-
diana cōti-
nuapermi-
xtio tri-
plex.* niamus. Cōposita enim ex tertiana & quo-
tidiana cōtinua (quam vocamus semitertia-
nam) vel habet flauam bilem exuperātem,
proindeque flauæ bilis symptomata vehe-
mentia: vel hanc pauciorē, pituitam verò
copiosiorē, proindeq; quotidianæ conti-
nuæ pathemata certiora: vel neutrū altero

*Semiter-
tiana ex-
quisita.*

humore exuperantiore, sed ambos æquales;
quæ sanè exquisita semitertiana est, talis spe-
cie qualem Hippocrates indicauit, scribens
libro primo epidemion ad hūc modū. Plæ-
rique in hunc modum afficiebantur: Febris
horrida, continua, acuta, in totum minimè
intermittēs. Modus autē semitertianæ erat,

*Horrida
febris quid*

diem quidem vnū habens leuiorem, altero
autem grauius affligens, atq; ad acutiorem
dispositionem increscens. Horridā autem
dixit, nō simpliciter febrem incipientem cū
horrore (nā innumeris febribus id accidit,
de quibus deinceps docebo) sed in qua bo-
nam partem accēssionis horror occupat alte-
ra duntaxat die, in qua simul inuadunt ter-
tiana ac quotidiana cōtinua. Sequens enim
dies quotidianam tantūmodò habet. Quo
circa prima dies magna ex parte permixtam

*Semiter-
tiana ex-
quisita ac
cessio.*

ex vtrisque febrem cōmittit: secūda autem
cōtinuam quotidianam. Interdum enim pri-
ma die incipere pituitosam, secūda autem
vtrunque cōtingit. Accēssio igitur commu-

nis

nis ex vtrifq; quoties æquales fuerint humo-
 res, talis est, qualē paulò antè descripſimus
 semitertianam. Vbi verò tertiana exuperat, *Semiter-
 tiana ma-
 gis biliosa.
 Semiter-
 tiana ma-
 gis pituito-
 sa.*
 febris magis horrida est, & aliquid vigoris
 in accessione assumit. Statim itaq; calidior
 talis est atque ardentior, ac celerius perue-
 nit ad cōsistendi vigorem: & item quēdam
 bilis vomitum: vel deiectionem, vel mado-
 rem infert. Vbi verò humor pituitosus exu-
 peret, frigus extremarū partium exuperat,
 & horror parvus est, & pulsus † contractio
 fortior ac diuturnior est, ac lentè accessio
 increſcit, & multo post tēpore viget: non ta-
 men sitim efficit, neque ardorem, neque vo-
 mitus, neq; deiectione biliosa, vel mador per
 eam existit. Atque huius mixtionis duarum
 febrium etiam Archigenes ipse in notitiam
 quandam deuenit, sed confusè & incertè,
 quemadmodū indicauimus septimo libro,
 quem contra ipsius commentarios de pulsi-
 bus effectimus. Existimat enim in semiter-
 tiana quādoq; exuperare tertianā febrem;
 quandoque quotidianam: non tamen mi-
 xtione æqualem earū quæ sola semitertia-
 nam exquisitam committit, aut cognouit,
 aut indicauit, sed penitus omisit. Cū enim
 æquales magnitudine sunt intermittens ter-
 tiana & quotidiana cōtinua, initiū accessio-
 nis cum horrore existit, id enim medium
 Horror.

rigoris, perfrictionisq; existit, è quibus alterum tertianæ, alterum quotidianæ cōtinuæ inest. Incrementum verò post initium propter tertianā facilè suscipit caliditatem, atque ad cōsistendi vigorem festinat: propter pituitosam autem tardum, quātum in ea est efficiētem incrementum, inhibetur atq; interrūpitur. Atque est veluti quādam pugna

Symptomatiū pugna.

Pituita otiosa.

Accessiōis repetentis occasio.

Incrementum semitertianæ.

Vigor semitertianæ.

symptomatiū, interdum incalescente ægro, quoties tertianæ calor, vehemētius agēs ad cutem humores effert, detinente autē interdum ac retrahente intrò huius moriū pituita, quæ otiosa ac frigida est ex naturâ, ac difficilè mouetur, & tardè transmeat. At verò in tali pugna, exuperāte frigido humore cōtractio efficitur, & horror ac frigus partium extreimarū & cutis: ita vt altera accessio rursum incipere videatur. Quòd si calidior exuperet, vniuersim calefiūt, & propè ad vigorem peruenisse videtur. Dein paulò post exuperante pituitoso, ægri rursus cōtrahuntur, refrigerantur & horrent. Idque minimè definit vique ad cōsistendi vigorem, qui maturius quàm pro pituitoso humore, tardius quàm pro bilioso existit: quoniam pituitosus detinet biliosi celeritatē, biliosus tamen tarditatē ac segnitiem pituitosi accelerat. Atque huiusmodi quidē exquisita semitertiana est, ex æquali temperamento

duarum febrium, & duorum humorum effecta. Ea verò quæ minimè exquisita est, vel humorem biliosum, vel pituitosum obtinet ampliore.

Semitertianam esse febrem continuam, nec unquam deduci ad integritatē: sed errasse Agathinum, uocātem semitertianam omnem febrem diuturniorem.

CAPUT X.

AT verò secunda implexio ac mixtio est duarum febrium tertianæ & quotidianæ, sub similem efficiens accessionem prædictæ: sed differentem eò quòd hæc deducatur ad integritatem, & quòd secunda die, vel cum horrore vel rigore quotidiana sola effecta, incipiat. Quocirca talis febris non insuper semitertiana erit: siquidem semitertiana cōtinua censetur. Si verò in altero genere febrium eam annumeremus, nō solum talis, sed etiam aliæ quædam febres nominabuntur semitertianæ. Ob eam rem mihi videtur Agathinus omnes productas tertianas, appellare semitertianas. Sed enim cum de nominibus potius quàm de rebus tales quæstiones sint, immorandum in eis minimè censeo. Nam alio libro seorsum de vocabulis medicinalibus dictū iam est: in quo id ostēditur ac definitur in plenum, quænam

Tertiane & quotidiana implexio secunda.

Semitertiana est continua.

*Semiter-
tiana fe-
bris quæ di-
cenda sit.* sint de rebus, & quænam de nominibus con-
trouersia. Quocirca rursus ad res ipsas re-
deamus, semitertianā ab Hippocrate nomi-
natam horrificam & continuam, quam ter-
tiana quotidiana continuæ permixta com-
mittit: intermittenti autem, minimè efficit:
*Horrificæ
accessio.* propterea quod febris ex vtraque cõposita,
necessariò & ipsa intermittens existit. Neq;
verò ex duabus continuis, biliosa scilicet ac
pituitosa, fieri potest semitertiana, neque
*Ingemina-
tiones.* enim mixtio horrificā facit febrē, neq; mul-
tas ingeminationes habētem. Quum enim
*Duarū cõ-
tinuarum
implexio
tertia.* omnis cõtinua febris suapte ratione, quum
exquisita est, neque habeat horrorem, neq;
rigorem: neque etiā febris ex eis cõposita,
horrificæ erit. Oportet ergo si eadē futura
sit horrificæ simul ac continua, generationē
*Horrificæ
febris.* habere eā ex duabus febribus: altera quidē
intermittente, altera autem continua. Et ob
eam rem tertiana permixta quotidianæ cõ-
tinuæ, committit semitertianam: neque am-
*Tertianæ
cõtinuæ et
quotidia-
næ inter-
mittentis
implexio
quarta.* bæ intermittentes, neque ambæ continuæ
possunt cõmittere talē febrem. Restat igitur
vna mixtio quæ ex quotidiana intermit-
tente, ac biliosa continua constans, potest
cõtinuam simul atque horrificam cõmitte-
re febrem. Sed hæc contrā quā prima, ha-
bebit continuitatem quidem ex biliosa, hor-
rorem autem ex pituitosa, atque ingemina-
tio

tiones ex pugna mutua, maximeq; quoties humores ipsi fuerint æquales. Vincentis vero eorum alterutrius ex symptomatis agnitio in prima mistione declarata est. Hæc omnia de quatuor mistionibus biliosæ febris ac pituitosæ, magis propria sunt libro qui est de typis: sed hic necessario dicta sunt propter semitertianā: cuius generationem Archigenes ad tertianam quotidianamque retulit: nequaquam videns se intermittente efficere febrem. Agathinus verò perspicue cōfessus est eiusdem generis esse cū tertiana semitertianam, dissidentem tantūmodo magnitudine accessionis. Si igitur omnes febrium differentias accuratè persequuti, lapsi nominibus essent, fuisset id ferendū. Sed cū neque simpliciū, neque cōpositarum omnes scripserint differentias, & ad hæc quasdam alias superuacuas adiecerint, nihil neque in præfensionem, neq; in curationē iuuant, nos conati sumus pro viribus diligēter excollere omnem typum, longo tēpore, ex vfu simul ac ratione, vtilis in eo differentias peruestigātes. Simples ergo ad præsentē attinent librū: implexæ autē ex his, attinent ad *Melācho-*
librū de typis, cuius penitus ignarus nō eris, *licarū im-*
vbi hunc diligenter euolueris. Ex iis enim *plexus.*
quæ diximus de febre pituitosa ac biliosa inuicē permixtis, licebit hæc ad atrā bilem

Implexus transferentes, de implexu cū vtraq; earū ac
quid. tēperamento coniicere:implexū nominan-
Tempera tes, vbi diuersis horis incipiāt:temperamen-
mentum tum, vbi initium eodem tēpore sit. Nēc se-
quid. cus tres febres implicare ac temperare quis
Febris spe per se ipse poterit sumpta ratione de prædi-
cies. ctis. Horum enim omnium initium, fons &
 elementum est, diligenter internoscere cu-
 iusque simplicium febrium speciem. Neque
 enim magnus numerus earū est: sed omnes
 tres existūt, biliosa, melancholica, ac pitui-
 tosa, quarū cuiusque duplex differentia est,
 intermittēs & cōtinua, ita vt omnes simpli-
 ces differentię febriū ex humoribus putri-
 dis cōsistentium sex numero sint. Quod si
 qua alia illis accesserit, in his particulatim
 differētia ex copia hūoris, quātitate et qua-
 litate putredinis, necnō modò motus, et par-
 te in qua putrescit, generationem habebit.

*Quo pacto erret Agathinus, appellans febrē
 omnem semitertianam, cuius accessio plurimum
 producat.* CAP. XI.

Exquisita
tertiana,
eiusque
nota.

Q Vale hoc sit quod iam proponatur
 ex iis febribus intermittētibus quæ
 tertio quoque die infestant, cui quidem &
 accessionis tempus breue est, & initium cum
 rigore, & solutio cum sudore ac vomitu bi-
 lis, vel etiam inferna aluo deiciente bilio-
 sa:

fa: huic nomen inditum est exquisita tertia. *Tertiana*
 na: cui verò aliquid horum deest, non am- *non exqui*
 plius exquisita, sed simpliciter tertiana vo- *sita.*
 catur. Quòd si & intermissionem minorē *Tertiana*
 habuerit, producta scilicet accessione, tertia *producta.*
 nam hanc nominant productam: tamet si
 hæc maioris minorisque ratione differen-
 tiam magnam obtineat. Ac licet hanc qui-
 dem absoluto sermone appellare productā,
 quæ cum quatuor & viginti horas accessio-
 nis occupauerit, reliquas sine febre obtinet: *Tertiana*
 hanc verò admodum productam, cum eirci *admodum*
 ter triginta horas febris producit: & hanc *producta.*
 præterea magis productam, cum ad sex & *Magis pro*
 triginta procedit: & hanc aliam plurimum *ducta.*
 cum ad quadraginta & eo amplius produci *Plurimum*
 tur. Sed hæc omnia definire certis terminis *producta.*
 non licet ob facerualem dubitationē. Ne- *† σωπετι-*
 que verò necesse est talem nominum sub- *κῆρ. ἀπο-*
 tilitatem quærere, cum liceat nobis etiam *εἶαρ.*
 sine ea indicare iis qui adsunt diligenter de *Cibandi tē*
 vnoquoque ægro, & rectè curare, ac euen- *pæ indica*
 tum morbi, præsentire. Subiiciamus enim *tur acces-*
 quempiā quindecim horis febricitare, esse *sionis &*
 autem sine febre tribus & triginta, atque id *intermis-*
 deinceps ei accidere ex proportionē. Sanè *sionis tem*
 cibandi tempus certa scientia sumere lice- *pore.*
 bit tum ex accessionis, tum intermissionis
 tēpore, & quicquid ex eo sumi vtile potest

ad præfensionem & curationem, id quoque abundè suppetet, etiam si non quæratur tertianàmne absoluto sermone oporteat nominare talem febrem, an cum quadam alia adiectione definiente ipsam differentiam. Quin & volens indicare alia ratione febrè ægri quænam sit, diligentius indicabit, accessionis & intermissionis dicens longitudinem, quàm quærens nomen quod perspicuè, ac definite indicare idem queat. Hæc igitur optima enarratio, atque doctrina est. Secunda autem est quam paulò antè dixi, exquisitam quandam tertianam nominans, aliam verò simpliciter tertianam, mox aliam paulùm productam, deinde aliam admodum, aliam autem magis, postremò plurimum aliam. Sed ex omnibus obscurissima ac pessima est, quæ prima est prodita: ob quam recentiores medici quotidie inter se certant, atque contendunt, ne id quidem cognoscentes se de nomine contendere. Sed de aliis quis fortasse minùs mirabitur: de Agathino verò magis mirandum: siquidem productam quandam nominans quotidianam & quartanam, intertiana minimè seruauit proportionem: sed cuius ampliùs producta fuerit accessio hanc nominat semitertianam. Sed de nominum ratione hætenus, nam & ipse plus quàm par est

est temporis in ipsis contero, proinde tempus est, ut ad considerationem aliarum rerum redeamus.

Quonam modo ex sanguine putrefacto febris accendatur biliosa: & quod sanguinis pars tenuior uertatur in flauam bilem, crassior in atram.

CAP. XII.

SEquens est ut agitetur consideratio nihilò inutilior, utrum quemadmodum ob utranque bilem ac pituitam fiunt genera quædam febrium, ita & ob sanguinem putrescentem eueniat. Febris enim diaria, eo tantummodò calefacto (ut diximus) haudquaquam putrefacto consistit. Per ipsam uero putrefactionem (necesse est enim interdum sanguinem putrefieri) quærendum febrium ipsarum genus. Id autem inuentum iri par est, si prius inuenerimus quonam modo sanguis putrescit. Constat enim Aristotelem rectè dixisse, fieri putrefactionem ab aliena caliditate, intelligit autem alienam, externam, non natiuam, nec unicuique rei propriam. Hæc enim concoquere: aliena uerò corrumpere solet, quod est putrefacere. Extrinsecus autem caliditas superuenit sanguini per æstum, ac pestilentem constitutionem, & ut summam dicam, per omnes febres ex quacunque causa in generationem deducatur.

Sanguis an comittat febrē putridam. Ephemera fit sanguine calefacto. Sanguis putrefit. Putredinis causa. Caliditas aliena. Caliditas aliena causa externa.

Internæ. Quinetiam ubi in quapiam animalis parte
Putrefa- sanguis copiosior collectus, supra vires eius
tionis san- fuerit corrumpitur: maximeq; quoties in far
guinis cau- ctus est ob crassitiẽ in parvis vasis, aut impa-
sa duplex. ctus ob copiã. Quemadmodũ accidit in bu-
 bone & phymatis, & vt in summa dicam, in
Pleuritis. omni inflãmatione. Nã in tali dispositione
 Reiecta sanguis duplici ex causa corrumpitur: tũ
 per tußim quia minime diffatur, tũ quia à natura mi-
 sanies in nimẽ vincitur. Quod autẽ quæ minime dif-
 pleuritide flantur, putrescere soleant, in cũctis exteris
 quid indi- corporibus intueri licet, fructibus, semini-
 cet. bus, atque etiam vestibus: atque persuadere
 id quod dicimus, maximẽ potest pleuritis.
Febris ex Expuũt enim per eã alii spumofam, alii pal-
sanguine lidã, alii rubram saniem, quæ nihil aliud est
 est cæteris quàm humoris in inflammatione vincentis
simplicior pars quæ nõ cõtinetur, sed præ tenuitate fo-
Febris ex ras resudat. Interdũ etiam talis sanies nigra
sanguine apparet, ac neq; statim ab initio, sed proces-
circuitio. su tẽporis, præcedẽte magna ex parte palli-
 Sanguinis do sputo, quod erat indicatiũ flauæ bilis exu-
 mutatio in perantis: quemadmodum spumofum pitui-
 alios hu- tæ, rubrum sanguinis. Quocirca ratione nõ
 mores. caret interdum putrescere sanguinẽ ipsum
 in locis inflammatione affectis, febremque
 ex eo simpliciorẽ esse quàm ex aliis humo-
 ribus. Proportionem autem accessionum
 tertianæ circuitiois potissimum sumit (ita
 enim

enim fieri cernitur & in pleuriticis quoties
 rubrum expuunt) ubi verò supra modum
 affatur, mutatur penitus. Pars enim tenuissi-
 ma simul ac pinguis in pallidam bilem: cras-
 sior autem in atram vertitur, quemadmo-
 dum accidit in carbunculis. Etenim in his *Carbuncu*
 sanguis vehementer feruefactus mutatur in li-
 humorem melancholicum. Ad hunc verò
 modum inaudire oportet humorem melan *Humorme*
 cholicum, tanquam nōdum effectus sit atra *lancholi-*
 bilis: sed in confinio quodam collocatus. Fe- *cus.*
 bres igitur consistent pro specie humoris, in
 quem sanguis mutatur, tantummodò dissi- *Febris ex*
 detes malignitate & clementia. Simplicio- *sanguine*
 res enim sunt ex mutatione sanguinis: tūm *mitior.*
 cætera: tūm caloris lenitate. Etsi enim quā
 maximè multus manus occurſu depræhenda- *Caloris fe*
 tur, prorsus tamen mitis est: quemadmodū *brilis co-*
 is qui post balnea accidit. Copia enim calo- *pia sequi-*
 ris febrilis in ipsa effluuii copia semper posi- *tur, copia*
 ta est: molestia verò, si admou eas extrinse- *effluuij.*
 cus manum, in ipsa caliditatis acrimonia, *Humor cō*
 idque erit tibi indicium maximum humoris *mittens fe*
 committentis febrem: intelligo autē ipsius *bre ex ca-*
 caloris qualitatem. Qui enim vaporosior est *loris quali*
 atque minùs molestus, sanguis est: qui mole *tate de-*
 stus, erodensque & mordax, ex bile consi- *præhendi-*
 stit. Vbi verò in primo occurſu vaporosus *tur.*
 potiusquàm mordax sentitur, diutius autem

immorantibus paulatim ei acrimonia accedit, eaque maximè inæqualis, ita vt per cotuitosa fistulum quoddā, vel cribrum transmitti videatur talem febrem ex pituita putrescente consistere sciendum est.

Multa morborum genera repetere per circuitionem, ut ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articulare. CAP. XIII.

CAeterùm consideranti mihi quærenti; causam ob quam febres ex aliis humoribus calorem habent equabiliter occurrentem: quæ verò ex pituita consistunt, distam obtinent inæqualitatē: apparuit mihi potissimum causa esse lentor crassitiesque humoris, & dissolutionis difficultas. Huius enim, vt aliorum omnium, quicquid semper extenuatum est, per halitum digeritur: vix autem extenuatur, quicquid crassissimum: ac multò minus, si frigidū naturā sit. Quocirca neque totum, nec æqualiter, sed quicquid putredo occupauerit, id solum in flatus vertitur, ac extenuatum foras fertur ac perinde euenit vt in glutinosis crassisque humoribus externis dum elixantur. Existunt enim ex eis bullæ, quibus ruptis spiritus vniuersè educitur, simul secum abducens humorem attenuatum. Vbi verò tenuis humor elixatur, neque bullæ efficiuntur, & qui ab eo
atto

attollitur vapor omnino similis ac continuus sibiipfi est: sed cùm de his satis dictum sit, sequens est vt agamus de causa febrium synochorum. Mirum enim mihi esse videtur sæpè vsque ad quartum vel quintum, & interdum vsque ad septimum diem, vnã fieri accessionem in eis ab initio vsq; ad finem. Quanquã si quis consideret diligenter, magis mirum est quasdam febres repetere per circuitiõem. Exemplum enim supra dictum à nobis de stercore particulatim putrescente, non perinde potest accidere, quàm in corpore animalis putrescentes humores cum his qui putredine vacant, faciliè misceri possint, vtpotè quum ex omnibus cõfluxus, conspiratioque in omnia existat. Quocirca minimè fieri potest vt putredo in vna aliqua parte, aliàs alia fiat, nisi inflammatio colligatum detineat incipientem putrescere humorem. Cùm igitur ratio in contrarium cedat, difficiliusque sit inuenire causam febrium circuitiõis repetentium quàm synochorũ, de vtrisque nitemur differere, neque hinc producentes sermonem, neque contradicentes erratis aliorum, sed (vt in omnibus antè fecimus) veritatẽ ipsam tantummodò persequentes, qua nixus possis deprehendere errata aliorum. Incipiendum igitur ab iis quæ manifestissimè apparent, cuiusmodi sunt

Hic initium

cap. 13.

Cap. 7. pri

mi.

Putridi

humores

in corpo-

re.

Morbi per

circuitum

repeten-

tes.

Ophthalmia. sunt ophthalmiæ quædam, quarum hæc quidam singulis diebus, hæc autem tertio quoque die infestare cernuntur. Nec secus aurium dolor & capitis, vel totius, vel dimidii, quem nominant hemicraniam. Nonnullis verò etiam podagra ac dolor articularis repetit per circuitionem. Vt igitur in his omnibus videre licet venas ipsas in partibus quæ infestantur in tumorem attolli, & phlegmonem augescere, & dolores intendi, & fluxionem insignem foras procumbere: ita existimandum est in partibus internis, quæ minimè apparent, servari eandem proportionem. Verbi gratiâ per inflammationem pleuritides, ac perineumoniæ intumescere quidem inter initia accessionum, discuti verò ac subsidere per inclinationem. Sed quonam modo id fiat foras, ad ea tasse inueniemus, si ea quæ de inflammationis generatione & rheumaticis affectionibus vocatis alibi demonstrata sunt, ad memoriam reuocauerimus. Si enim simul cum illis adiecerò quæcunque propria huic sermoni sunt, præsentibus quæstionibus sufficient.

Quam ob causam fluxiones certis temporibus decumbant, & quòd partes debiliores promptius suscipiant excrementa. CAP. XIII.

Flu

Fluxionem igitur decumbentem in o-
culos, omnes quidem cōcedunt ab ipso
capite defluere, sed quānam causa sit ob
quam p̄finita circuitione s̄penuerò de-
fluat, dicere minimè possunt: vt qui nequa-
quā commentati sint in facultatibus natu-
ralibus, de quibus ipsi tribus libris perscri-
psimus, indicantes omnes quatuor esse, à qui-
bus plantæ & animalia gubernantur. Vna
ei go est quæ attrahit proprium alimentum,
altera id ipsum detinet: tertia autem ab his
alterat: quarta ab his aliena expellit. Alie-
num autem in omnibus rebus duplex est: al-
terum qualitate, alterum quantitate. Id ve-
rò propter sitarum in ipsis partibus faculta-
tum fortitudinem atque imbecillitatem col-
ligitur. Nam si quidem paribus sint viribus,
& meatus deferentes excrementa se habue-
rint secundum naturam, partes ipsæ sanæ
sunt: si verò plus quàm alterari queat assum-
ptum sit, excrementum omne excerni à fa-
cultate expultrice pulsum necesse est. Quòd
si hæc imbecillis sit, eodem in loco mane-
re necesse est. Atque si multum sit, grauat
eum ipsum, atque distendit, si acre sit ero-
dit & mordet, quemadmodum si calidum
sit, calefacit: si frigidum, frigefacit, atque
hæc perspicua sunt in iis quæ in ventre habē-
tur. Quidam nanque ingerentes plus alimē-
ti,

*Oculorum
fluxiones
ex capite
sunt.*

*Vires na-
turales
quatuor.*

*Alienum
qualitate
& quanti-
tate.*

*Excremen-
ti causæ.*

*Congestio
nis & de-
fluxionis
causa.*

ti, interdum vomere coguntur nauseabūdi:
interdum alui fluore corripitiur. Quod igitur
hic per maxima spatia excernitur eru-
ctantia foras excrementum, id in aliis parti-
bus animalis per tenues meatus non foras,
sed ex aliis in alias transfluit partes: expellen-
tibus quidem fortioribus, suscipientibus ve-
rò debilioribus. Porro rursus expellitur ex
his in alias, atq; ex illis in alias defluit, quous-
que in debilissimas omnium decumbat. Id
autem rursus recurrere inde in alias fortio-
res nequaquam possibile est. Atque ob eam
Plethora. rem per plethoram ac vitium humorē par-
Humorū tes omnium debilissimæ aliās inflammatio-
uitium. ne, aliās erysipelate, vel herpetibus, vel alia
Partes de quapiam affectione præhenduntur, aut ha-
biliores. bent affectionē quam rheumaticam nomi-
Fluxio. nant, de qua seorsum scripsimus. Quocirca
Defluxio- minimè mirum videri debet, cerebrum vel
nes ex ce- etiam totū interdum caput vbi collegit ali-
rebro. quod excrementum, in aliquam partem de-
† γνάθον. biliorē expellere, aut in aures, aut oculos,
Caput ua- aut tēpora, aut labrū, aut dentes, aut † genas,
riorū mor aut palatum, aut gingiuas, & gurgulionem,
borū cau- & tonsillas, & adenas ibi contentos: atque
sa. vbi nullum ex his fuerit imbecille, in thora-
cem, pulmonem, fauces, gulam, vētriculū,
fluxionem trāmittit. Quemadmodum er-
go caput sæpenumerò prædictorum cuique

causa morbi est : ita inflammationis in iecore & liene, proximarum aliqua partium, aut etiam in eheerle, vna longiùs positarum, vel plures quæ excrementa gignunt, augment, trāsmittunt, & circuitione affligūt. Ac nihil miri est his accidere affectum similem excretioni excrementorum ventriculi. Quēadmodum igitur si quis videret quidem quātū quotidie excernitur, ignoraret autē causam excretionis, miraretur ordinem: ita qui nescit neque generationis in capite excrementorum, neque excretionis causam, ignorat autem & quamobrem hæc foras decumbāt, illa in aliquam aliam partem trāsfuāt: hæret atque miratur influxus proportionem. Pari autē modò, & qui ignorat quæ partes excrementum iocinori transmittunt, miratur proportionem excitatarum ex iecore febrium. At qui nouit decumbētem in viscus fluxionem & primum phlegmones initium dedisse, & sequentis accessions ipsam partē affectam autorem esse, mirari desinit.

*Circuitus
modus.*

Quonam modo ex calore attrahantur excrementa: & quòd dolor omnis irriter fluxiones.

CAPVT

XV.

Decursus

CAeterum duplex causa est huiusmodi humorū influxus humorum, vna quā proximè plex cauidicaui, quoties ex aliis partibus in alias sa.

debiliores excrementa trāsmittuntur: altera
 vero, quoties attrahūtur, de qua hoc loco
Partis su- agendum, initio sermonis petito ab iis quæ
scipientis omnibus prospicua confessaq; sunt. Si enim
imbecilli- tapſiam illinas cuipiam, videbis paruo tem-
tas, pore partem huic esse calidiorē, atque in
Partis su- tumorem non paruum attolli. Nec secus si
scipientis foueas partem quampiam iuxta ignem, aut
attractio. fortiter fricēs, aut vngas resina, aut pice mo-
 dicè calida, deinde paulò pòst euellas vni-
 uersim, aut si etiam vngas partem quopiam
 medicamento calido, videbis enim ex his
 omnibus ipsam attolli in molem: quia calor
Calor ad ipse, vel ad se trahere, vel suscipere soleat
se trahit fluxionē. Verū necesse non est in præsens
uel fluxio- talia definire, id quod vtile est instituto iā
ne suscipit. habētes, etiā sine huiusmodi cōtemplatio-
 ne. Semper enim in partes vehementius ca-
Pars ex- lescentes decumbere fluxio videtur: vbi cor-
crementis pora plena sunt, atque abundant excremen-
abundans tis, admodum larga: vbi vacant excremen-
aut uacās. tis, pauca. Decumbit prætereā maximè & in-
 dolentes. Sic namque sæpè cui suminus digi-
 tus manus minima acu punctus est, statim do-
 let; & paulò post partes quæ circiter sunt in-
 flammatione laborant, atque in molem ma-
 ximam tolluntur. Quibusdam verò etiam
 bubones sub ipsis alis erūpunt, vbi accepe-
 rint aliquid fluxionis rara & spōgiosa quæ
 ibi

ibi habetur corpora, quos Græci nominant
 adenas. Quibusdam autem accidit id in me *Adenes*
 dio brachio ubi insignis aden ea parte exti- *quid.*
 terit. Perspicue id quod dicimus videre li-
 cet, quoties vlcus aliquod exiguum sine in-
 flammatione ac dolore prope vnguem fue-
 rit. Si enim hoc contemnatur, neque coeat,
 & ad cicatricem deducatur, innata ipsi caro
 ab vngue pressa primùm quidem dolet, de-
 inde totus digitus, aliquādo verò & eorum
 corpus, & interdum manus vel pes in maxi-
 mam deducitur inflammationem. Ita igitur *Dolor at-*
 dolor attrahit in dolore affectas partes flu- *trahit.*
 xionem, non tamen causam huius hinc dicere
 oportet. Alibi enim commodius est dicta,
 nec illius in præsens indigemus. Videtur er- *Fluxionis*
 go iam causæ fluxionum ex ipsis partibus la- *causa du-*
 borantibus fluxione ortæ esse duplices. Vna *plex.*
 ex calore qui in eis accenditur: altera ex do- *Calor at-*
 lore qui superuenit. Causa autem cur aut *trahit.*
 plus, aut minus, aut benignius, aut deterius *Dolor at-*
 influat, est non in ipsis solum partibus labo- *trahit.*
 rantibus fluxione: sed cur benignius dete- *Maioris*
 riùsve influat, in ipsis partibus mittentibus *fluxionis*
 causa est: cur autem plus minùsve, in vtris- *causa.*
 que? Calor enim fortis ac dolor, plus debi- *Excremen-*
 lior, minus attrahit. Itidem corpora excre- *tosa corpo-*
 mentis vacua exiguum quiddam trahen- *ra.*
 tibus mittunt: excrementosa autem ac ple-

thorica tantò plus mittunt, quantò ab ipso naturæ habitu longiùs recesserint. Atq; hæc quidem fluxionum differentia sine debilitate partium fluxione laborantium recipiuntur. Alia verò & ob harum debilitatem: *Fortitudo mittentium* ac fortitudinem mittentium excrementa, efficiuntur. Omnis enim inflammatio sine *Febbris ob inflammationem fluxionis.* vulnere ac collisione præhendens partem, excrementis quibusdam decumbentibus ex fortioribus in debilia existit. Talis autem inflammatio statim accendit febrem, quoties ob magnitudinem, aut vicinitatē calor ex ea ad cor peruenerit. Decumbentia igitur excrementa in omni inflammatione putrescunt propter causas prius dictas. Nec similiter omnia putrescunt, eò quòd quædam sunt pituitosa, alia melancholica, nonnulla biliosa. Ipsis autem putrescentibus accenditur calor præter naturam in parte inflammatione affecta: simul quidem calefaciens quæcunque primæ tangunt inflammatione obsessas partes, deinde illis continuas, ex quibus rursus alia ratione vicinitatis calefactæ, rursusque alia ab illis usque ad ipsum cor deferunt interdum caliditatem. Sed quænam sit dispositio in parte inflammatione affecta, diximus in libro de intemperie inæquali: & item in libro de tumoribus præter naturam. Quòd autem ne-

cess

cesse sit contentum in ea sanguinem putre. *His eū ex-*
fieri sæpenuero, simul cū materia quæ in- *crementis*
fluxit, in hoc dicitur. *putrescit.*

Colligi excrementa diuersis tēporibus, quæ sæ-
penuero ordinē minimè seruēt, atq; esse quādo-
que breuem, quandoque longam acceſſionem.

CAPVT

XVI.

EXcrementum igitur quod decubuit ex *Excrementū*
 vna parte in aliam, interdum adeò *defluēs*
 multum prauumque est, vt partis labo- *duplex.*
 rantis fluxione lædat vires: interdum adeò
 mite ac exiguum, vt suscipiens corpus mi-
 nimè offēdat. Si igitur adeò debilitet vi- *Vires exo-*
 res vt exoluantur, nec prætereā euincant *luta.*
 ea quæ prius vincebant, tunc sanguinem
 putrefieri necesse est duplici ratione: &
 quia humor minimè euictus à calore pro- *Putrefa-*
 prio reliquam habet in putredinem muta- *tionis du-*
 tionem: & quia simul cum excrementis *plex cau-*
 putrescentibus putrescit. Si non tantum *sa.*
 lædat vires vt exolutæ penitus quiescant,
 semiprauus & tanquā semiputris, in tali con- *Sanguis se-*
 stitutione sanguis efficitur: vicinitate qui- *mi putris.*
 dem putrescentiū excrementorū simul pu-
 trescens, persistens tamē in sua ipsius natura
 quātum est in ratiōe facultatis ipsum cōfi-
 cientis. Vtcunque autem se res habeat, ac- *† διακρο-*
 census calor per primam putredinem peni- *μύσσης.*

Calor pu- tus acrior ac mordacior est quam foret dum
trise mor per naturam haberet, atque tantum crescit,
est mor quantum natura ipsa excrementorum suf-
dax. ficiat. Hæc enim talem habent proportio-

Analogia. nem ad calorem ex eis accensum, qualem

† **Addēdū** ligna ad ignem obtinent. † Hæc tamen mi-
ex qbusdā nimè in infinitum tempus sufficiunt ad al-
græcis co- terationem : sed terminus alterationis ipsis
dicibus, ex est, humoris innati consumptio, nam eousq;
ipsis enim cremari queunt, dum innatum habuerint
lignis dūm humorem : atque eo cōsumpto cremari de-
alteratur sinunt, ac reliquæ eorum nominantur ci-
generatur nis. Quinetiam putrescentium humorum
ignis. similiter calor permanet dum prorsus sint

Humorum affati, par est autem reliquias humorum
affatio. terrestres exiguas esse nequaquam multas,

Humorum quemadmodum lignorum : propterea quod
reliquiæ. in substantia eorum elementum humidum
 exuperat, non siccum. Simili modò si libeat

Analogia. coquere humorum externorum quempiam,

Inclinatio ut oleum aut vinum, terrestre quidem eius
nis causa. qui minimum relinquetur, reliquū autē to-
 tum extenuatum, in vaporem atque aërem

discedet. Itaque tota substantia feruifactorū
 humorū ex putredine extenuatorū ab ipso
Excremē- calore in ambientem dispergitur per vigo-
tum paucū rem, inclinationemq; febriū. Remanet au-
interdum tem iam excrementū omnino exiguum, vel
nullum. nullū : in humoribus quidē crassioribus exi-

guu

guum, in serosioribus autem nullum. Quòd si nulla debilitas extiterit virium partis inflammatione laborantis, nec rursus mittantur excrementa: & morbus solutus est, & *Morbi* posthac haud iterum febricitauerit homo, *lurio.* neque sequenti die, neque tertio quoque die, *Secunda ac* neque quarto quoque. Quòd si ob eandem *cessionis* causam mittantur excrementa ob quam ab *causa.* initio parti mittebantur, aut si hæc quidem non amplius mittantur, sed permaneat virium debilitas: denuò febricitare hominem necesse est. Subiiciatur enim primum, facultas partis robusta, tempore verò interueniente eisdem in partibus quæ prius transmissæ rant, collecta esse excrementa paria quantitate & qualitate his quæ initio transmissæ rant. Hoc verò accidit his in quibus dispositio mittentiũ, & attracti ad ipsas alimenti quantitas & qualitas eadem permanet. Necesse enim est, æquale ac simile quod ab eadẽ alteratur facultate, æqualia ac similia facere excrementa. Quinetiam tẽpus collectionis eorum necessariò æquale erit. Partes enim quæ aluntur quoad similem habuerint constitutionem ab eodẽ nutrita alimẽto, æqualia quãtitate & similia qualitate, atque eodem temporis tractu colligent excremẽta, Quinetiam eadem circuitione incitãtur ad expellenda ea atque mittẽda debilioribus.

*Circuituũ
ordine re-
petentium
causa.*

† *πρὸς
σπῆξ.
Expultri-
cis faculta-
tis incita-
menta.*

Ophthalmia per circuitum repetens.

Siquidem tunc primùm expellendi facultas excitatur ad operationem suam, vbi grauat-
tur multitudine excrementorum, aut quali-
tate molestat. Sed de his omnibus in cõ-
mentariis de viribus naturalibus definitum
iam est : in quibus exercitatum esse cõuenit
eum, qui quæ nunc dicuntur, sit cum demon-
stratione intellecturus : magno quidẽ præ-
mio ipsi proposito ex tali contẽplatione ad
curãdĩ viam & rationem. Nã vt alia omnia
omittam quæ sum dicturus in eo libro vnus
tantummodo faciam mentionem, quòd ma-
ximè quidẽ in promptu est, quodq; ipsi sæ-
penumero fecimus, ophthalmiæ scilicet per
circuitum repetentis. Spero enim id non
paruum incitamentum fore lectoribus ad eã
quam hoc loco tradimus condiscendam do-
ctrinam. Contrà enim quàm ii qui se nomi-
nant ab oculorum curatione ophthalmi-
cos, curauimus semper huiusmodi ophthal-
miam. Nam cum illi semper oculis nego-
tium facerent, nos interdum purgatio-
ne, interdum balneo, interdum meri po-
tione (vt Hippocrates dicit) interdum san-
guinis missione, interdum vtrisque, vel cri-
stere cum sanguinis missione vsi sumus:
atque interdum statim his adhibitis desi-
uit, quandoque etiam vbi capiti fuisset
prospectum. Omnes enim qui ita curati
sunt

sunt, aut omnino accessiōem non habuerunt, aut semel solūm: sed multò leuiorem quàm prius. Sed de curatoriiis discretionibus ac de indiciis, nequaquam est hoc loco agēdum. Cæterū quòd accadat interdum totum caput aut minimè affectum, sed sanguine prauo atque excrementoso nutritum, colligere excrementa plura ac vitiosiora quàm antè, ita vt nequaquam eis sufficiant naturales effluxus ac perspiratus, sed cogatur natura expellere excrementum ad aliquam partem debiliorem, aut si humores secundum naturam se habeant, ipsum autem affectum sit, aut etiam ambo concurrant, colligi excrementa, atq; decumbere in aliquam partem, præsens sermo demonstrare studet. Etenim quoad decumbens humor similis fuerit, & capitis dispositio eadem, eousq; excrementa æquali colligentur tempore similia & æqualia, & accessiones oculorum similes erunt. Simili modò & si non totius capitis, at certè vnius alicuius in eo partis, aut meningū, aut cerebri ipsius fuerit aliqua dispositio, ita vt ex tali nutrimento colligat tantum taleque excrementū tantò tempore: deinde expellat excrementum id tunc primū quum ab eo insigniter molestatur: accidet & tunc per circuitiōem infestari vel oculos, vel aures, vel ali-

Sanguis excremento

Excrementa cur decumbunt in partes alias.

Oculi ac aures circuitiōe laborantes.

† *ῥοπερ*
fortasse
ῥιπερ. i. si.
Pleuritis.
Peripneu-
monia.
 † *Quidam*
ex codice
græco hæc
addit, eo-
dēq; modo
febrem ac
cendere.
 † *κατὰ μί-*
αν πρὸς το
μίαν. id est
uno certo
tempore.
Tēpus col-
lectiōis ex
crementi.
Inæqualiū
accessionū
causa.

quid aliud tale, in quod debilius expulsum fuerit excrementū. † Vt igitur in oculis, vel auribus, ac pedibus, & aliis multis partibus talibus perspicuè videtur fieri accessio per cutitionem, quemadmodū ostēsum est: quid mirum in pleuritide, & peripneumonia, & phrenitide, & aliis omnibus quorū nō licet intueri inflammationes, similiter fluere excrementum? † nullo alio ipsa parte inflāmatione obfessa affectu laborante peculiari ac proprio ad dictorum generationem, quā quod mittentibus excrementa eo tempore imbecillior est. Neque etiam illud mirū videri debet, quod non eodem tēpore colligantur omnia excremēta. Quod enim neq; qui defertur ratione alimenti sanguis semper similis est, neq; dispositio partium quæ aluntur eadem, idcirco aliud ali tēpus satis est ad tantū excrementi collectionē. A quo primum natura partis molestatur, cogiturq; veluti alienum à se id quod molestat, expellere. Neque porrò mirandum est, ipsarū accessionū longitudinē inæqualem esse, cum enim neque genus, neque multitudo excrementorum vnā sit, neque similiter accendi in omnibus, neque discuti conuenit. Nā plura quidē & frigidiora, & glutinosa, & crassa, longiores committunt accessiones: pauciora autem & calidiora & tenuiora bre-
 uio

uiiores: conducente ad id non parum totius corporis constitutione eo tēpore & virium robore. Corpus enim rarius breuiiores, quā tum in se est, efficit accessiones: densius autem longiores. Et robur quidem virium, breuiiores: debilitas autem, multò longiores. Facultas enim valida pròptius à se expellit id quod est alienum: corporis autem raritas, minimè detinet id quod effertur. Quocirca ita affectis citò euacuari excrementum necesse est: si etiam alia similia existant. Pari ratione quibus ecōtrario corpus afficitur, iis necesse est esse longiorem excretionem excrementorum, debiliter expellente excrementa facultate: detinente autem ea quæ efferuntur, angustia meatuum. Omnibus autem simul concurrentibus, aut breuissima aut lōgissima accessio fit. Longissima quidem, ob crassitiem, & multitudinem excrementi, ac virium imbecillitatē, meatuumq; angustia: breuissima autem, ob tenuitatem, & paucitatem excrementi, & robur virium, ac viarum amplitudinem.

Quam ob causam accessiones desinant ad integritatem.

CAPVT XVII.

Simili modo nec quā ob causam accessiones quædā desinant ad integritatē, quædam

*Glutinosā
frigida,
crassāq;
Corpus ra-
rum.
Deſum cor-
pus.
Robur.
Excretio
cita.
Excretio
tarda.*

*Accessiōis ad integri-
tatem desi-
nētis cau-
sa.* dam verò non, difficile est inuenire. Quo-
ties enim prioris accessiōis tēpus adedò bre-
ue fuerit, vt priusquam secūda incipiat, iam
prima defierit: mediū principii secūde, prio-
risque finis intervallum totū sine febre ext-
stit. Sed vbi secūda prius incipiat, quā prior
omnino solvatur, nihil harū medium relin-
quitur. Hoc igitur (vt diximus) fit, quum fa-
cultas partis excrementa recipientis sui simi-
lis esse pergit, hoc est, adhuc, vt antea, san-
guinem qui in ipsa habetur, vincit. Quòd si

*Implexus
febriū cau-
sa.*

*Generatio
nis excre-
mentorum
duplex ra-
tio.*

*Calid. faci-
lè corrup-
pitur.*

quando debilis efficiatur, idque ei causa sit
cur non excrementa solum, sed ipse etiā san-
guis corrumpatur ac putrefiat, & febris accē-
datur: alterum inde quoque initium orietur
circuitu repetentium accessiōnū. At si qui-
dem prædictus adhuc seruetur calor, duplex
erit genus febrium inter se amplexarum. Si
verò ille quidē desinat dispositio verò su-
scipientis fluxionē permaneat, quæ de mittē-
te sunt dicta prius, de hac intelliges. Hæc
enim pars efficiet in se quædā excrementa
duplici ratione, quemadmodum & illa, tum
quia prauus est sanguis contentus in ea, tum
quia facultas debilis est. Nec sec⁹ si ex qua-
uis causa reddita sit interdum debilis partis
dispositio: adedò vt onus ipsi potius quā ali-
mentum sit sanguis adiectus. Corruptetur
enim: & si calidus fuerit, facilè putrescet. Si

verò

verò subfrigidus ac pituitosus, non statim *Febris ex*
quidē: sed processu tēporis is quoq; eandem *congestio-*
suscipiet dispositionem. Quinetiā vbi ne- *ne.*
queat concoquere quælibet pars genita in
se excrementa, aut expellere ad aliam, tale
sibi ipsi initium febricitandi, quale ea quæ
transmittit alteri, adfert. Cur autē nequeat *Excreme-*
alteri mittere excrementa, prima quidē cau- *ta cur non*
sa est in viribus mittentis suscipientisq;: al- *mittitur.*
tera autem in viarum obstructione, quæ à
glutinosi, crassius, & multis fieri solet humo-
ribus. Nihil igitur miri est, si etiā absque eo
quòd altera mittat alteri excrementū (quē
admodum caput oculis mittebat) ex excre-
mentis in ipsa adhuc manentibus in eandem
suscipienti aliena dispositionem deuenierit. *Infarctio.*
Quæ enim obstruxerūt naturales effluxus,
processu temporis ea quoque putrescāt ne-
cesse est: & causa sint oportet ob quam mul-
titudine excrementorum in parte minimè va-
cuetur, & vt solita erat diffletur. Putrescunt
igitur vt illa ea quoque quæ postea colligū-
tur, & omnia simul accendunt statim in par-
te caliditatem febrilem. Suprà autem indi-
cauimus vbi accenditur quædam vel etiam
augetur caliditas, in eam partē ab aliis san-
guinem defluere. Itaque necesse est, vt tem- *Caloris ac*
pore quo defluit, partes illæ refrigerentur *ensio uel*
sanguine destitutæ: pars autem affecta gra- *augmentū.*
uetur

uetur atque distendatur: & qui defluxit sanguis alteretur, propter duas causas, & quia putrescētibus iam excrementis permiscetur, & quia impactus minimè diffiatur. Quocirca succēditur instar lignorū humidiorū cōfertim in exguam flammā coniectorū, atq; id tēpus omne initium accessionis appellatur. Vbi verò calor superat materiā, appellatur incrementum & ascēsus, tale tēpus. Atque eo tēpore augetur calor tam multus, vt non solum deīrat locum ipsum, qui veluti causa quædam putredinis est, sed iam per continuitatem depascatur vniuersum corpus: & vbi ad summum peruenerunt feruorem, qui accendūtur humores: appellatur vigor talis pars accessionis. Vniuersum verò ignitū esse videtur tūc ægroti corpus, calore in vniuerso animali æqualiter intenso: deinde si quidam humores tenues sint, ac facultas valida, & corpus ratiū, pars plurima feruefactorum humorum fusa in sudorem vacuatur. Quod si crassi fuerint, ac expultrix facultas debilis, & viæ angustæ, nihil quidē sensibile effluit: sed solū id quod ita extenuatū est vt in habitus tenuis transierit naturā, appellatur autē id tēpus inclinatio, quæ perspiratio quædam est humorum feruefactorum. Sed vbi in parte dispositio permaneat, necesse est alterū in ea gigni excrementū: cū quod

rursus in eam attrahitur alimētum, non plane totū vincatur. Quod rursus (vt antè docuimus) & ab excrementis putridis in parte ipsa relictis, & ab ipsa ppria prauitate, initium putredinis suscipit: & vbi admodum incaluerit, rursus decumbit in ipsam, vt prius dictus ex aliis animalis partibus sanguis, rursusque eodem modo, initium, incrementum, vigor & inclinatio accessionis fit. Atq; hoc certo ambitu tantisper fit, dum affectus in parte primū gignente excremēta seruatur.

*Sequentis
accessionis
causa.*

*Quāobrem febres interdū repetāt per circuiti-
onem, interdū cōtinuæ sint. CAP. XVIII.*

AT verò dispositio talis duplex est: altera quidē partis debilitas, per quā gignūtur excremēta: altera verò ex ipsis quotidie genitis collecta. Caue enim putes in vasis externis in quib⁹ elixa cibaria nidore lēta euaserūt, dispositionē quandā relinqui: in partibus aut in quibus humores putrescūt, nullā permanere. Quum sanè hæc affectio ægrè soluatur, quoties vniuersum corpus malis humoribus abūdet, ac plethoricū sit, multoq; ægrius, quoties in his fuerit angustia omnium meatuum partis excremēta eductum, quēadmodum & sanatio subsequetur, si & meatus expurgētur, vt partis meatus fluxiles sint, & vires roborētur, & dispo-

*Dispositio
partis affe-
ctæ duplex
debilitas
& excre-
menta.*

*Sanatio fe-
bris quan-
do subse-
quitur.*

sitio

fitio corrigatur:& vniuersum corpus neque malis humoribus scateat, neq; plethoricum sit. Quādiu autē hęc permanent, circuitionem accessionū permanere necesse est. Similiter accidit in mulieribus. In eis enim quoad similis causa & æqualis permaneat menstrua. struorū, eadē eorū circuitio retinetur. Sed de his omnibus in libro de rheumaticis dispositionibus latius docuimus:& nūc immorari diutius in cōfirmandis iis quæ antē demonstrata sunt, minimē cōuenit: neq; præterire capita rerū in præsens vtiliū. Maximē autē vtile est cognoscere, quod aliquæ partes aliis transmittūt fluxiones, quemadmodum caput oculis: quādā verò ab excrementis in se genitis initiū febricitādi suscipiunt: & quòd his omnibus cōmune excrementorum putredo est. Propriū verò singulis, huic quidē infarctio ac stipatio vasorum, aut ex humore glutinoso, vel crasso, vel multo: alteri verò angustia meatuū vel sensibilibum, vel minimē sensibiliū: alii aut quòd omnia spacia vacua in toto ipsius corpore sunt oppleta, & ab his plenitudo ad vires: quēadmodum in libro de plenitudine docuimus. Febrīū igitur circuitione repetētīū haud scio an vlla generationis causa omissa sit. Earū autē quę ordine carēt, nōnullæ ob humoris mutationē, nōnullæ ob rationis victus errorem,

rem, ad eiusmodi constitutionē deueniunt. Sanguis igitur putrescēs maximē mutatur, quoniā (vt ante diximus) partim flaua bilis, partim atra efficitur. Quātūm igitur humores in corpore ægro mutātur, tātūm & circuitiones accessiōnū. Quocirca minimē mirū videri debet, per tales mutationes ordinē quoq; mutari. Mutātur verò maximē, vbi q̄ incepit putrefierit, in aliqua parte alius existit, alius autē ex aliis defluit, qui aut in illis solis talis habebatur, aut in toto animalis corpore exuperabat. Nec secus quæcunque ægri inuictus ratione delinquūt, hæc quoq; nihilò minus corrūpūt circuitiōnis ordinē. Vt enim in sanis paruus victus morborū causa est, eodem modo vel magis etiā in ægris, ex iis quæ deliquerint, accessiōnes inordinatæ existūt. Nec solū adhuc egrotātes, sed etiā quo tēpore à morbis se recolligūt, prōptè ex quouis delicto læduntur. Quocirca per omnē insignē læsionē vel præuenire multū circuitiōnes cogūt, aut diuersi generis à prioribus quasdā gignūt, à quibus accessiōnum ordo corrumpitur. Sæpè verò ob implexionem circuitiōnū incognitam medicis, ægri visi sunt pati inordinatas accessiōnes. Sed tales ordinum permutationes reuera nō sunt: sed tantūmodo videntur. Quæcunque autem reuera sunt, aut ob permuta-

Humorum

permuta-
tio.Error in
uictus ra-
tione.

Febris æ- tionē humorū cōmittentiū febres, aut ob
qualiter errorē in victus ratione efficiūtur. Reliquū
affligentis porrō synōchorum genus (quarum totum
increscen- tēpus vna accessio est, aut semper æqualis,
tis & de- aut decrescens, aut increscens vīque ad iudi-
crescientis ciū) ex tali causa fieri solet, qualem omnī
causa. febriū Praxagoras statuit, humorū in ca-

Morborū ua vena putredinem esse existimās, sed ab-
circuitio solutioꝝ sermo ac verior hoc modo euadet.
ne & sine Quicunq; circuitionibus quibuscūq; repetunt
circuitio morbi, partium superueniunt dispositioni-
ne infestā bus, vel mittentiū, vel suscipiētiū, vel gignē-
tiū disci- tium, vel trahentiū excrementa, eo quo pau-
men. lō suprà diximus modo. Qui verō sine cir-
 cuitione fatigant, in his nullus locus peculia-

ris affectus est: sed humores in venis & arte-
 riis omnibus, maximeq; qui in maximis &
 calidissimis sunt, aut ob aliquā aliam cau-
 sam, vt in diariis, aut etiam ob putredinē fer-
 uefacti, accendunt febrem vnā continuam,
 ab initio vsque ad finem minimē intermit-
 tentē, eatenus durātem, ac deūrentē homi-
 nē, quoad gignentes eā humores sint cōsum-
 pti, aut concocti, aut vtrunque passi.

SECUNDI ET VLTIMI

LIBRĪ GALENI DE DIFFERENTIIS FEBRIUM

finis.

INDEX CAPITVM

PRIMI LIBRI.

*



Vanam sint febriū differentiaē principales: & quod essentia febriū

fit in genere caloris præter naturam.

Cap. I.

Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum in humoribus, interdum in partibus animalis solidis, quas Hippocrates continentia nominavit.

II.

Quonam modo febris ephemera, id est diaria, ex causis externis atque euidentibus præhendat.

III.

Multas esse causas caloris præter naturam ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia corpora promptè se habeant ad continendā diutius caliditatem.

IIII.

Ex putredine accendi febrem cuius causa est obstructio, ac potissimum putrescere quæcunque calida atque humida sunt.

V.

Pestilentis febris causam esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispo-

sitionem sit preparatū quoniam maxima pars generationis morborum est corporis preparatio.

VI.

De præcautione, & quonam modo diaria febris ex bubone consistat.

VII.

Quod pus optimum sit candidum & crassum & minimè foetidum, & quod optima urina habeat sedimentum candidum, æquale ac minimè foetidum, & quibus indiciis febris diaria cognoscatur.

VIII.

Quibus indiciis cognosci conueniat febrem putridam, ac de duritie pulsus nonnulla contra Archigenem.

IX.

Quibus indiciis febris hectica cognoscatur: & quonam modo cōsumpto admodum humore cordis, dispositio efficiatur, quā Philippus nominat ex morbo senectā.

X.

De febre hectica: & quod diaria sæpenuerō transeat in hecticam, cuius rei indicia multa existunt.

XI.

De indiciis communibus cuiusque hectica, febri: & quam

INDEX CAPITVM.

ob causam post ingestum cibum, calorem ipsum augeri contingat. XII.

Maximum indicium esse febris hecticae, quoties arteriae ipsae sint quam corpora quae circiter sunt, calidiores: & quod non oporteat solum circuitione, sed ipsum febrium

genus considerare. XIII.
Quibus indiciis febres diariae à se inuicem discrepēt: quoniam interdum propter aestum, quandoque ex frigore febris diaria consistit. XIII.

Finis capitum primi
libri.

INDEX CAPITVM

SECVNDI LIBRI.



DE differentiis febrium ex humorum putredine infectatiū: ubi refellit opinionem ponentium omnem febrem putridam fieri ex abundantia bilis. Cap. I.
Febrium intermittētium tres haberi differentias: quotidianam, tertianam, & quartanam: atque esse synochon, id est cōtinuam, quam flaua bilis committat. II.

Quonam modo ex flaua bile delata in vniuersum corpus rigor existat: & quod ipsius tertianae accessio, quod longissimum sit, horas duodecim occupet. III.

Pituitam refrigerare partes extremas per initia acces-

sionum, difficulterque accendi calorem minimè purum, sed simile fumo, quasi viridioribus accensis lignis. IIII.

De quartana quae ex atra bile consistit & quonam modo fieri possit, ut rigor sine febre efficiatur. V.

De febre epiala qua simul febricitant ac rigent: ac de humore quem Praxagoras vitreum appellauit, & quonam pituitae genera sint. VI.

Quot modis conueniat fieri implexus febrium, ex quibus aeger minimè deducitur ad integritatem. VII.

Permisceri inuicem febres, scilicet tertianam exquisitam, & quotidianam: & quonam modo Agathinus errauit circa semitertianam. VIII.

De

INDEX CAPITVM.

De differentia semitertianæ.

IX.

Semitertianā esse febrem continuam, nec vnquam deduci ad integritatem, sed errasse Agathinum, vocantē semitertianam omnem febrem diuturniorem.

X.

Quo pacto erret Agathinus appellans febrem omnē semitertianam, cuius accessio plurimum producat.

XI.

Quonam modo ex sanguine putrefacto febris accendatur biliosa: & quòd sanguinis pars tenuior vertatur in fluuam bilem, crassior in atram.

XII.

Multa morborum genera repetere per circuitionem: vt ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articulare.

XIII.

Quam ob causam fluxiones certis temporibus decubant:

& quòd partes debiliores promptius suscipiant excrementa.

XIIII.

Quonam modo ex calore attrahantur excrementa: & quòd dolor omnis irriter fluxiones.

XV.

Colligi excrementa diuersis temporibus, quæ sapenunero ordinem minimè seruent atq; esse quandoq; breuem, quandoque longam accessionem.

XVI.

Quam ob causam accessiones designant ad integritatem.

XVII.

Quam ob rem febres interdum repetant per circuitionem, interdum continuæ sint.

XVIII.

INDICIS CAPI-

TVM FI-

NIS.

*

h 3

INDEX EORVM QVAE HIS

DVOBVSLIBRIS CON-

tinentur, prior numerus, librum:

secundus, caput in-
dicat.

A



- | | |
|--|---|
| Abitionis diariæ
in putridam no-
ta. 1.9 | Accessionis species. 2.7 |
| Abitionis hecti-
cæ in marcorem
nota. 1.12 | Accessiōis tertianæ nota. ibi. |
| Abcessus & vrina sunt pre-
portionales. 1.8 | Accessionum tertianæ diffe-
rentiæ. 2.3 |
| Accessionis repetentis occa-
sio. 2.9 | Accessiones implexarum fe-
briū concurrentes. 2.7 |
| Accessionis accidentia. 2.7 | Accessionum inordinatarum
causa. 2.18 |
| Accessionis sequētis cā. 2.17. | Accidens duplex. 1.1 |
| Accessio æqualis quid. 1.11 | Adenes quid. 2.15. |
| Accessionis æqualis discrimi-
na. ibidem | Æqualitas febris à primo ini-
tio. 1.12 |
| Accessionis longioris aut bre-
uioris causa. 2.16 | Ær immoderate calidius ac
humidus. 1.6 |
| Accessio pituitosæ febris. 2.4 | Affectio somno similis. 1.11 |
| Accessio pituitosæ continuæ.
2.7 | Agentis virtus ac passi aptitu-
do. 1.6 |
| Accessio horrida. 2.8 | Alienum qualitate & quanti-
tate. 2.14 |
| Accessionis ad integritatem
desinentis causa. 2.4. & 2.17 | Alteratiōis mora in heθica.
1.12 |
| Accessionum inæqualiū cau-
sa. 2.16 | ἀμφιμερὶνδς. 2.8 |
| Accessionis secundæ causa. ibi. | Analogia. 1.1. & 1.7. & 1.10.
& 1.12. & 2.4. & 2.13. & 2.16.
& 2.17 |
| | Aqua frigida. 1.12 |

Ar

Arquati.	2.1	Caloris differentia triplex. 1.2
Arquatis superuenit febris.	2.5	Caloris inæqualiter occurren-
Arquati atra bilares.	2.5	tis causæ. 2.13
Arteriæ aliis partibus calidio-		Calor pulsusq; inæqualis. 1.9
res.	1.13	Caloris multiplex gñatio. 1.4
Assatio humorum.	2.16	Caloris accensio vel augmen-
Addictionem & obstructio-		tum. 2.17
nem aliæ febres sequuntur.		Calor mordax. 1.9
1.4		Calor mordax inter initia. 1.9
Auctionis caloris causa potif-		Calor p̄so occursumitis, diu-
sima.	1.4	tius immoranti mordax. 1.12
Aurium dolor.	2.13	Calor putris est mordax. 2.16
B		Caput veriorum morbo. cā. 2.14
Biliose & pituitose discri-		Capitis grauedo ob ætū fre-
men inter initia.	2.4	quens. 1.14
Bilis exquisita.	1.5	Carbunculi.
C		2.12
Caliditas aliena.	2.12	Carbunculi materiæ.
Caliditatis alienæ cau-		1.5
sæ externæ.	2.12	Καθυσπεριδς.
Caliditatis alienæ causæ in-		2.8
ternæ.	2.12	Causa p̄gressa ephemeræ. 1.8
Calidū facile corrūpitur.	2.17	Causa p̄gressa. 1.8. & 1.11
Calor hecticæ.	1.11	Causa p̄gressa quas febres
Calor ad se trahit vel fluxio-		præuenit. 1.9
nem suscipit.	2.15	Gibaditēp̄ indicat accessiois
Calor attrahit.	2.15	& intermissiois tēpore. 2.12
Calor, continue putrescentia		Cibaria glutinosa crassaq; 1.5
depascitur.	1.7	Cibus bonus triplici forma vi-
Calor ex suppressione calidi		tiatur. 1.4
-effluuii.	1.4	Gibi mali forma duplex. 1.4
Calor ex calidi occurso.	1.4	Gibi vitiosi incommoda. 1.4
Calor ex motu & ebullitione.		Cibo ingesto post horā calor
1.4		& velut æqualis accessio. 1.12
Caloris febrilis copia sequitur		Cirquitiones ex defluxione fio-
-copiam effluuii.	2.12	ri. 2.13
		Circuituum modus. 2.14
		Circuituum ordine repetentiū
		causa. 2.16

- Circuituum ratio, præuentio
scilicet & cunctatio. 2.7
- Color sine flore viuido. 1.11
- Comesa, phagedænæ. 2.5
- Côcoctionis imbecillæ causæ.
1.6
- Concretionis causæ. 1.9
- Conditione pestilenti quid a-
gendum. 1.6
- Congestionis & defluxionis
causæ. 2.14
- Côtinua in forma quotidiana
habens accessionem me-
diam. 2.2
- Continuarum febrium diffe-
rentiæ. ibidem
- Continua in forma tertianæ.
ibidem
- Continentia, contenta, & im-
petum facientia. 1.2
- Contagiosi morbi. 1.3
- Côtinua ex flaua bile duplex;
synochia & continua. 1.2.2
- Côtractionis pulsus velocitas.
1.9
- Corpus rarum. 2.16
- Corpus densum. ibidem
- Corporis præparatio bonam
partem actionis sibi vendi-
cat. 1.6
- Cutis tactu sicca & quasi bur-
sa. 1.11
- D
- D**ebilitas recipientiũ. 2.15
- Decursus humorum du-
plex causa. ibidem
- Defluxiones ex cerebro. 2.14
- Densum corpus. 2.16
- Diariæ in putridâ abitio. 1.9
- Dies caniculares. 1.6
- Differetiæ caloris de materia
ductæ propriissimæ. 1.1
- Differentiæ caloris ab inten-
sione. ibidem
- Difflatiõis forma duplex. 1.4
- Difflatio. 2.17
- Dispositio permanens in par-
te affecta. ibidem
- Dispositio partis affectæ du-
plex, debilitas, & excremen-
tum. 2.18
- Dolerattrahit. 2.15
- Duarum continuarum pitui-
tolæ & tertianæ implexio
tertia. 2.10
- Duritiæ pulsus causa. 1.9
- Duritiæ arteriarũ causa. ibid.
- E
- E**ffluuium vaporosum &
mordax. 1.4
- Effluuium mordax qui-
bus excernitur. ibid.
- Empirici & rationalis diffe-
rentia. 1.3
- Epacmaistica febris. 2.2
- Ephamera fit sanguine calefa-
cto. 2.12
- Ephemeræ propter æstum no-
ta. 1.14
- Ephemeræ propter æstum &
frigus differentia. ibidem
- Ephemeræ propter astrictio-
nem

I N D E X.

nem nota.	ibidem	Febricitare parati.	ibidem
Ephemeræ & putridæ febris discrimen.	1.7	Febris ardentis in hecticam abitionis causa.	1.12
Epiale causa.	2.6	Febrîū causæ vniuersales.	1.4
Epidemiorum morborû præ- cautiones.	1.7	Febrîum differētia duplex.	1.1
Error in victus ratione.	2.18	Febrîum differentiæ principa- les.	ibidem
Erysipelas.	2.5	Febris diuisio.	ibidem
Excrementû defluēs dupl.	2.16	Febris triplex.	ibidem
Excrementorû reliquiæ pau- cæ, interdum nullæ.	ibidem	Febrîum essentia.	ibidem
Excrementa quare eadē per- manent.	ibidem	Febris ephemeræ gñatio.	1.7
Excrementa cur decumbunt in partes alias.	ibidem	Febris ephemeræ indicia.	1.8
Excrementa cur non mittun- tur.	2.17	Febris epiala.	2.6
Excrementosa corpora.	2.15	Febris æqualiter affligentis, inrescentis, & decrescētis causa.	2.18
Excrementi causæ.	2.14	Febris ex bubone duplex, e- phemeræ, & putrida.	1.7
Excretio cita.	2.16	Febris ex inflammatione.	1.5
Excretio tarda.	ibidem	Febris ex lassitudine.	1.4
Exiguitas febris.	1.12	Febris ex congestione.	2.17
Ex labore febris.	1.4	Febris ex mœrore.	1.4
Ex morbo senectæ.	1.10	Febris ex sanguine est cæteris simplicior.	2.12
Expultricis facultatis incita- menta.	2.16	Febris ex sanguine circuitio.	1.12
Exquisita tertiana.	2.3	Febris ex sanguine mitior.	2.12
Exquisita tertiana, eiusq; no- tæ.	2.11.	Febris ex flaua bile indiciū.	2.3
Exquisita semitertiana.	2.8	Febris epialæ causa.	2.6
Extenuantia, acriq;.	1.5	Febrîum generatio & causæ prægressæ.	1.3
F		Febrîum genera se consequio trahunt.	1.2
Facilè permutabilia	1.2	Febres hecticæ.	1.9
Facilè & difficilè patibili- lia.	1.6		
Febricitantes ex cruditate.	1.4		

- Febris interperies est calida.** 1.3
Februm intermittentium & continuarum discrimen. 2.1
Februm intermittentium species & differentiae. 2.2
Febris marasmodies. 1.10
Febris marasmodies calida est & sicca. ibidem
Febris ob inflammationē fluxionis. 2.15
Februm ordo. 1.2
Febris pestilens interdum ab humore, frequentius ab ære putrido. 1.6
Febris pituitosa signum. 2.12
Febres putridae. 2.9
Febris paruae reliquiae. 2.11
Febris quartana. 2.1
Febris quartanae materia. 1.2
Febris quartana quibus accidit. 2.1
Febris quartana an vlla sit. 1.7
Febris quotidiana. 2.8
Febris quotidiana materia. 2.1
Febris quotidiana quibus accidit. 2.1
Febris ratione societatis. 1.5
Febris sedes, est cor. 1.4
Febris semitertianae pulchra historia. 2.8
Febres simplices, compositarum sunt regula. 2.2. & 2.10
Febris solutu difficilis. 2.5
Februm species ex humore. 2.10
Febris tertiana & quotidiana duplex. 2.6
Febris tertianae materia. 2.7
Febris ut ephemera in secundum diem extenta. 1.11
Febris tertiana quibus accidit. 2.5
Fluxio. 2.14
Fluxionum duplex causa. 2.15
Fluxionis maioris causa. 2.15
Fortitudo intermittit. 2.15
Frequentia pulsus per exteriorem quietem. 1.9
Frons sicca intentaque. 1.11

G

Generatiōis excrementorum duplex ratio. 2.17
Glutinosa, frigida, crassaque. 2.16
Graeco in febre & defluxio. 1.14

H

Hectica. 1.9
Hectica fit duobus modis. 1.10
Hectica ab initio præhens. ibidem
Hectica periculo propior. 1.11
Hectica spei propior. ibidem
Hectica ambigens. ibidem
Hectica incipiens sola. ibidem
Hectica triplex. ibidem
Hectica curabilis. 1.10
Hectica difficilis. 1.11
Hecticae generatio. ibidem
Hectica media. ibidem
Hectica citra marcorē. ibidem
Hectica non habet accessionē sed

I N D E X.

sed alterationem huius simili-		Humor cūctim putrescēs.	1.7
lem.	1.12	Humor incensionī propēsus.	2.4
Hectica febris putrida imple-		Humor melancholicus.	2.12
ta.	1.11. & 1.13	Humorum affatio.	2.16
Hecticæ occasiones.	1.12	Humorum reliquiar. <i>ibidem.</i>	
Hecticæ principium.	1.9. & 1.11. & 1.12	Humorum vitium.	2.14
Hecticæ cū marcōre indi-		Humorum permutatio.	2.18
cia.	1.1		
Hecticæ perfectæ nota.	1.11	I gnis sacer, seu erysipelas.	
Hecticæ tabificæ obnoxia.	1.12	1.3. & 2.5	
Hecticæ febris maximum si-		Ignorantiæ causa.	1.3
gnum.	1.13	Ignorantium medicorum ge-	
Hecticæ ab aliis habentibus		nus duplex.	<i>ibidem.</i>
æqualem accessiōem differe-		Ilia in thoracem retracta.	1.11
rentia.	1.12	Impatibiles ab aëre pestilen-	
Hecticæ & continuæ differen-		ti.	1.6
tia.	1.11	Implexus quid.	2.10
Hecticarum febrium commu-		Implexus febriū causa.	2.17
nia.	1.12	Impotentia vigilandi.	1.11
Hemicrania.	2.13	In accessiōe longitudinis	
Herpetes.	2.5	causæ.	2.5
Homotonos.	2.2	Inclinatio accessiōis quid	
Horrida febris quid.	2.9	est.	2.17
Horrida accessio.	2.10	Inclinationis causa.	2.16
Horrida febris.	<i>ibidem.</i>	Inclinatio non desinens ad	
Horror, rigoris frigorisq; me-		integritatem.	1.9
dius.	2.8	Incrementū accessiōis quid.	
Horror.	1.9. & 2.9	2.17	
Humidi consumptio.	1.11	Incrementum semitertianæ.	
Humiditate ebullitio.	<i>ibidem.</i>	2.9	
Humidus calor magis senti-		Incrementum æquale.	1.8
tur.	<i>ibidem.</i>	Inflammatiō.	2.5
Humor committens febrē ex		Infarctio.	2.17
caloris qualitate deprehen-		Ingeminationes.	2.10
ditur.	2.12	Initii accessiōis signū.	2.8
		<i>Init</i>	

Initium accessioneis quid. 2.17
Initium pituitosæ simplicis. 2.4

Intermissione tertianæ tem-
pus. 2.3

Intermissio pituitosæ. 2.4

Intermissio pituitosæ deter-
rior. 2.4

Iræ calor quādo fit febris. 1.4

L

Libri Galeni de pulsi-
bus. 1.9

Lippitudo arida. 1.11

Logicæ vsus. 1.3

M

Marcor. 1.10

Marcor post ardentem
febrem. ibidem

Marcor incurabilis. 1.11

Media hectica. 1.8

Medici officium. 1.7

Melancholicarū febrium im-
plexus. 2.11

Menstrua. 2.18

Morbi per circuitum repeten-
tes. 2.13

Morbi solutio. 2.16

Morborū circuitione & sine
circuitione infestantiū diffe-
rentia. 2.18

Mors sine mœnore. 1.10

N

Non insignis mutatio
in febre. 1.11

O

Obftructio. 1.5
Oculi ad aures circui-
tione laborātes. 2.16

Oculi concaui. 1.11

Oculorum fluxiones ex capi-
te sunt. 2.14

Ophthalmia. 2.113

Ophthalmia per circuitum
repetens. 2.16

P

PAlpebrarū ossa promi-
nentia. 1.11

Partes debiliores. 2.14

Pars excrementis abundans
aut vacans. 2.15

Partis suscipientis attractio.
ibidem.

Partis suscipientis imbecilli-
tas. ibidem

Paracraftica febris. 2.2

Peripneumonia. 2.16

Pestilenti cōditione quid agē-
dum. 1.6

Phagedænæ. 2.5

Phrenitis. 2.16

Phlegma acidum. 2.6

Phlegma dulce. ibidem

Phlegma falsum. ibidem

Phlegma vitreum. ibid.

Pituita vitrea. ibidem

Pituita otiosa. 2.9

Pituita quid. 2.6

Pituitæ species. ibidem

Pituitæ tres differentiæ. ibid.

Pituitosæ inclinatio. 2.4

Pituitosa simplex. ibid.

Pitu

INDEX.

Pituitosa continua simplex & permixta.	2.7	Putredinis aeris principia.	1.6
Plenitudo ad vires.	1.5	Putredo accendit calorem.	2.15
Plethora.	2.14	Putredo triplex.	1.7
Pleuritis.	2.12. & 2.16	Putrefactio.	2.17
Podagra.	2.13	Putrefactio obnoxia.	1.5
Post inclinationem cum sua- ui vapore integritas.	1.8	Putrefactionis humorum mo- dus.	2.5
Præcautio.	1.7	Putrefactionis sanguinis cau- sa duplex.	2.12. & 2.16
Præfagiendi modus.	2.7	Putrefactionis causæ.	2.12
Principium hæcticæ.	1.12	Putredo concoctione permi- xta.	1.7
Pulsus magna citâq; ductio.	1.8	Putridi humores in corpore.	2.13
Pulsus contractio in febre ni- hilo concitator.	1.8	Putridum expirantes.	1.3
Pulsus parui inæqualisq; cau- sa.	1.9	Q uartana febris.	2.1
Pulsus in diaria durus. ibidè		Q uartanarum rigor.	2.5
Pulsus inæqualis. ibidem		Quartana materia.	2.1
Pulsus arctior quid est. ibidè		Quartana obnoxia.	2.5
Pulsus durus. ibidem		Quartana exquisitæ causa & intermissio.	2.5
Pulsus prima die durus. ibid.		Quartana accessio. ibidem	
Pulsus & calor æquabilis. 1.8		Quæstio an. omnis febris sit putrida.	1.7
Pulsus in febre putrida durus.	1.9	Quintana febris. ibidem	
Pulsus hæcticæ.	1.11	Quotidiana continua.	2.8
Pulsus pituitosæ.	2.4	Quotidiana simpliciter quid.	ibidem
Pus optimum.	1.8	Quotidiana cū frigore. ibid.	
Pus multiforme. ibidem		Quotidianæ materia.	2.1
Pus superante naturâ.	1.7	R ationalis utitur & ra- tione & experimento.	1.3
Puræ hæcticæ indicia.	1.11		
Puris & putredinis discrimi- na.	1.7		
Putredinis causæ.	2.12		
Putredinis simplicis causæ.	1.7		

Repetere accessione quid. 1.9
 Rigor ex pituita dulci. 2.6
 Rigoris circuitus. 2.5
 Rigoris tertianæ & quartanæ
 discrimen. 2.1
 Rigor inter initia. 1.9
 Rigor sine febre. 2.6
 Rigoris in febre tertiana, cau-
 sa. 2.6
 Robur. 2.16

S

S Anatio febris quando sub-
 sequitur. 2.18
 Sanguis an committat fe-
 brem putridam. 2.12
 Sanguinis mutatio in alios
 humores. 2.12
 Sanguis cum excrementis pu-
 trefcit. 2.15
 Sanguis excrementosus. 2.16
 Sanguis putrefcit. 2.12
 Sanguis semiputris. 2.16
 Sanies per tussim reiecta in
 pleuritide quid indicet. 2.12
 Satiæ morbi. 1.4
 Semitertiana. 2.2
 Semitertiana cū horrore inci-
 pit. 2.8
 Semitertianæ denominatio.
 ibidem
 Semitertiana febris quæ di-
 cenda sit. 2.10
 Semitertianæ permixtio tri-
 plex. 2.9
 Semitertiana est cōtinua. 2.10
 Semitertiana exquisita. 2.8.

& 2.9
 Semitertianæ exquisitæ acces-
 sio. 2.9
 Semitertiana magis biliosa.
 ibidem
 Semitertiana magis pituito-
 sa. ibidem
 Semitertianæ modus duplex.
 2.8
 Semitertianæ ex permixtio-
 ne æquali initium. 2.9
 Serpentina siue herpes. 2.5
 Siccitas cui hecticæ propria
 sit. 1.12
 Siccitatis causæ. 1.9
 Siccitatis hecticæ marasmo-
 dis argumenta. 1.12
 Similariū exarsio. 1.11
 Sitis. 1.14
 Species febris desinentem in-
 dicat. 2.7
 Squalida dispositio. 1.11
 Squaliditas. ibidem
 Subsistentia puri proportio-
 nabilis. 1.7
 Suavis calor. 1.8
 Symptomatum pugna. 2.9

T

T Emperamentum quid.
 2.10
 Tempora collapsa. 1.11
 Tempus collectionis excre-
 menti. 2.16
 Tensionis causæ. 1.9
 Terciana admodum produ-
 cta. 2.12

INDEX.

Tertianæ continua finitima.
2.2

Tertianæ cum quotidiana im-
plexæ hiftoria. 2.8

Tertianæ cum quotidiana
continuae permixtio triplex.
2.9

Tertianæ continuæ & quoti-
dianæ intermittentis imple-
xio quarta. 2.10

Tertiana cum rigore. 2.3

Tertianæ & quotidianæ im-
plexio fecunda. 2.10

Tertianæ & quotidianæ im-
plexus quatuor. 2.6

Tertianæ intermittentis cum
côtinua pituitofa nota. 2.7

Tertiana non exquisita. 2.11

Tertiana producta. ibidem

Tertiana magis pducta. 2.11

Tertiana quotidianæ imple-
xa. 2.6

Tertiana quotidianæ cõfufa.
ibidem.

Tertiana simpliciter vel ter-
tiana intermittens. 2.8

Tertio die inedia. 1.11

Totum offa & cutis. ibidem

Trium febrium implexus. 2.2

V

Vigor accessions quid.
2.17

Vigor mitior. 1.3

Viscerum inflamationes. 1.12

Vigor semitertianæ. 2.9

Vires naturales quatuor. 2.14

Vires exolutæ. 2.16

Vrinæ cruditas aut obscura
concoctio. 1.9

Vrina est cruditatis concoctio
nisq; potissimum indicium
in febre. 2.7

Vrina statim concocta. 1.8

Vrina optima. ibidem

Vrina peſsima. ibidem

INDICIS FINIS.

Lugduni,
EXCVDEBANT

**PHILIBERTVS ROLLETVS,
ET BARTHOLOMAEVS
FRAENVVS.**

IMPENSIS HONESTIS-
SIMORVM VIRORVM
GVIELMI ROVIL-
LII, ET ANTONII

CONSTAN-
TINI.

